





# Ueber das Verhältniss der specifischen Wärmen bei Gasen und Dämpfen.

---

## Inaugural-Dissertation

welche mit Genehmigung

der

**Philosophischen Fakultät der Königl. Universität Breslau**

zur Erlangung der Doctorwürde

**Montag den 7. August 1882 Mittags 12 Uhr**

in der Aula Leopoldina

öffentlich vertheidigen wird

der Verfasser

**Paul Müller**

gegen die Herren Opponenten

**O. Beling, Dr. phil. — C. Gudenatz, Cand. phil.**



Seinen theuren Eltern

aus Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom

Verfasser.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

## § 1.

Das Verhältniss der specifischen Wärme bei constantem Druck zu derjenigen bei constantem Volumen, welches schon früher beobachtet ist, hat in der neueren Zeit durch die Aufstellung der mechanischen Wärmetheorie eine besondere Wichtigkeit erlangt. Denn Clausius<sup>1)</sup> hat aus diesen Verhältnisse, welches Robert Mayer zur Berechnung des mechanischen Aequivalents der Wärme angewendet hat, das Verhältniss der molecularen zur gesammten Energie eines Gases abgeleitet und auch für eine Anzahl von Gasen und Dämpfen den Factor  $c$ , die specifische Wärme bei constantem Volumen berechnet, nachdem Regnault den anderen Factor  $C$  die specifische Wärme bei constantem Druck beobachtet hatte.

Die Grösse  $\alpha$ , womit wir das Verhältniss  $\frac{C}{c}$  der specifischen Wärmen bezeichnen wollen, ist ferner von O. E. Meyer<sup>2)</sup> dazu benutzt, verschiedene innere Vorgänge bei Gasen und Dämpfen festzusellen, wie z. B. die Verhältnisse der mittleren Energie aller Atome einer Molekel und des Mittelwerths eines einzigen Atoms zu der Energie der Schwerpunkts-Bewegung einer Molekel.

Ausserdem erscheint  $\alpha$  auch in der Formel für die Schallgeschwindigkeit, aus welcher es sehr genau ebenfalls hergeleitet ist.

Die Werthe von  $\alpha$ , welche nur für wenige Stoffe nach verschiedenen Methoden hergeleitet sind, zeigen bedeutende

<sup>1)</sup> Clausius, mechan. Wärmetheorie. 2. Aufl. I. pag. 52.

<sup>2)</sup> O. E. Meyer, Theorie der Gase. pag. 90.

Abweichungen, und es erscheint deshalb wohl wünschenswerth, diese Grösse durch eine andere Versuchsanordnung nochmals zu erforschen, und für eine Anzahl von Gasen und Dämpfen festzustellen.

Hierzu will ich einen Apparat verwenden, welchen Assmann<sup>1)</sup> angegeben hat. Seit jener Abhandlung ist diese Methode unberücksichtigt geblieben und auch nach meiner Kenntniss in den Lehrbüchern der Physik nirgend erwähnt, was wohl daran liegen mag, dass A. sagt, er hätte nur schlechte Resultate erzielt, aber sein Werth des Verhältnisses der specifischen Wärme für Luft stimmt mit dem jetzt als richtig angenommenen  $\kappa = 1,41$  innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler überein, und beruht seine Ansicht auf dem Vergleich seines Resultats mit den früheren Angaben anderer Beobachter.

Als Vortheile der Methode möchte ich anführen, dass nur die Schwingungszeit einer Flüssigkeitssäule zu beobachten ist, ferner dass der Apparat die Abhängigkeit des Werthes  $\kappa$  vom Druck und der Temperatur zu berechnen gestattet, und nur eine Gasmenge von 2—3 Liter erforderlich ist, während doch Clément und Desormes 20 Liter und Röntgen sogar 70 Liter gebrauchten.

Als Nachtheil der Versuchsanordnung ist zu bezeichnen, dass sich nur solche Gase untersuchen lassen, welche die schwingende Flüssigkeitssäule, in meinem Falle Quecksilber, nicht angreifen, aber durch Anwendung verschiedener Flüssigkeiten wäre vielleicht auch dieser Uebelstand zu beseitigen.

Gehen wir nun zur Besprechung unserer Bestimmungsmethode von  $\kappa$  selbst über, so beruht sie auf folgendem Verfahren:

## § 2.

Denken wir uns eine o-förmig gebogene Glasröhre theilweise mit einer Flüssigkeit gefüllt, so wird diese Flüssigkeit oscilliren müssen, wenn wir die Röhre durch einen Stoss

---

<sup>1)</sup> Assmann, Pogg. Ann. 1851 Bd. I.

aus ihrer Ruhelage entfernen, und wir können die Schwingungsdauer der Flüssigkeit bestimmen, falls die Glasröhre sogleich nach dem Stosse in ihre frühere Ruhelage zurückgeführt ist und selbst nicht mitschwingen kann.

Wenn wir nun die offenen Enden der Röhre durch Kugeln absperren und den ganzen Apparat auf dieselbe Art wie vorher bewegen, so wird sich die Schwingungsdauer der Flüssigkeitssäule ändern, weil das in den Kugeln enthaltene Gas durch die Schwingungen der Säule comprimirt und dilatirt wird und folglich durch die Compressionen und Dilatationen seinerseits den Bewegungen der Säule entgegen wirkt.

Betrachten wir diese Vorgänge im Apparat näher, so ergibt sich Folgendes:

Sei A B C die Glasröhre und in diese die betreffende Flüssigkeit bis A und B gefüllt, so wird nach der mitgetheilten Bewegung dieselbe sich bis a in dem einen Schenkel heben, und im andern um ein gleiches Stück bis a' senken, wenn wir annehmen, dass der Querschnitt überall derselbe, gleich q sei. Nennen wir nun die Entfernung A bis a' = x und l die Länge der ganzen Flüssigkeitssäule, D die Dichtigkeit der Flüssigkeit, ferner g die Beschleunigung der Schwere, so ist  $Aa' + Ba = ba = 2x$  und die bewegende Kraft wird =  $-2gqx D$ , und wir erhalten die Gleichung

$$\text{I.} \quad lqD \frac{d^2x}{dt^2} = -2gqx D \quad \text{oder} \\ \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2gx}{l}.$$

Dieses ist aber die Pendelgleichung, deren Schwingungsdauer sich

$$\text{II.} \quad T = \pi \sqrt{\frac{l}{2g}} \quad \text{oder} \quad \frac{\pi^2}{T^2} = \frac{1}{2g}$$

ergibt.

Denken wir uns nun die beiden Kugeln aufgesetzt, welche das Volumen  $V_1$  und  $V_2$  haben mögen, und sei in beiden der Anfangsdruck derselbe, so erscheint nach ertheiltem Impulse auch die Differenz der beiden Drucke  $p_1$  und  $p_2$  in

Folge der Compression und Dilatation als bewegende Kraft, und zwar weil sie auf den Querschnitt  $q$  wirkt, als

$$-(p_1 - p_2) q,$$

folglich wird die Differentialgleichung

$$1 q D \frac{d^2 x}{dt^2} = -2 g q x D - (p_1 - p_2) q$$

III.

oder

$$\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{2 g x}{l} - \frac{(p_1 - p_2)}{1 D},$$

worin sich die Differenz  $p_1 - p_2$  auf folgende Art bilden lässt:

Wenn wir annehmen, dass während der Compression oder Dilatation keine Wärme nach Aussen übergeht, so gilt die bekannte Formel der mechanischen Wärmetheorie <sup>1)</sup>:

$$p = P \left( \frac{V}{v} \right)^\kappa$$

Wird keine Wärme von Aussen bei meinen Ballons zugeführt, so ändert sich also der Druck in jedem einzelnen Ballon im umgekehrten Verhältniss der  $\kappa$ ten Potenz des Volumens.

Es sei im ersten Ballon

zur Zeit  $t = 0$ , der Druck  $P$ , das Volumen  $V_1$

$$t = t, \quad p_1 \quad v_1 = V_1 - qx,$$

im zweiten Ballon

$$\text{für } t = 0 \quad P \quad V_2,$$

$$t = t \quad p_2 \quad v_2 = V_2 + qx,$$

so ist nach jenem Gesetze:

$$p_1 = P \left( \frac{V_1}{v_1} \right)^\kappa = P \left( \frac{V_1}{V_1 - qx} \right)^\kappa \quad \text{und}$$

$$p_2 = P \left( \frac{V_2}{v_2} \right)^\kappa = P \left( \frac{V_2}{V_2 + qx} \right)^\kappa$$

Bisher galt  $p_1$  und  $p_2$  nur für einen Ballon bei den zwei aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der Compression und Dilatation, da aber diese Compression in dem einen Ballon zugleich mit einer Dilatation im andern verbunden ist, so dürfen

<sup>1)</sup> Clausius, mechan. Wärmetheorie. 2. Aufl. Bd. 1, pag. 66.

mit  $p_1$  und  $p_2$  auch die zu derselben Zeit herrschenden Drucke für beide Ballons bezeichnet werden und III gilt nun für beide Kugeln.

Folglich wird die in Formel III

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2gx}{1} - \frac{p_1 - p_2}{1D}$$

vorkommende Differenz

$$p_1 - p_2 = P \left\{ \left( \frac{V_1}{V_1 - xq} \right)^{\kappa} - \left( \frac{V_2}{V_2 + xq} \right)^{\kappa} \right\}$$

oder die rechte Seite nach Potenzen von  $x$  entwickelt

$$p_1 - p_2 = P \left\{ \left( 1 + \frac{\kappa q}{V_1} x + \frac{\kappa(\kappa-1)}{1.2} \frac{q^2}{V_1^2} x^2 + \dots \right) - \left( 1 - \frac{\kappa q}{V_2} x + \frac{\kappa(\kappa-1)}{1.2} \frac{q^2}{V_2^2} x^2 - \dots \right) \right\}$$

Vernachlässigen wir hier die Glieder mit den höheren Potenzen, so wird

$$p_1 - p_2 = P \kappa q \left( \frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) x = P \kappa q \frac{V_1 + V_2}{V_1 \cdot V_2} x.$$

Führen wir hierin  $P = \sigma g h$  ein, wo  $h$  die Höhe bezeichnet, welche in Millimetern Quecksilber dem herrschenden Druck entspricht, und  $\sigma$  die Dichtigkeit des Quecksilbers bedeutet, nehmen wir ferner als schwingende Flüssigkeit auch Quecksilber, so wird  $D = \sigma$ , und wir erhalten die Gleichung

$$\text{IV.} \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{gx}{1} \left\{ 2 + \kappa h q \left( \frac{V_1 + V_2}{V_1 \cdot V_2} \right) \right\}$$

Bevor ich aus Gleichung I. und IV. den Werth von  $\kappa$  berechne, möge noch die Reibung zwischen der schwingenden Quecksilbersäule und der Glaswand berücksichtigt werden.

### § 3.

Nach der Annahme Newtons haben wir uns die Reibung als eine Kraft vorzustellen, welche der gemeinsamen Berührungsfläche und der relativen Geschwindigkeit der beiden sich reibenden Flächen proportional ist, und diese Ansicht hat

auch für die äussere Reibung zwischen einer Flüssigkeit und einer festen Wand durch spätere Untersuchungen ihre Bestätigung gefunden.

Ich setze demnach diese Kraft, da sie der Schwingung der Säule entgegenwirkt,  $= o\varepsilon \frac{dx}{dt}$ , wo  $o$  die Oberfläche der Säule und  $\varepsilon$  der äussere Reibungscoefficient,  $\frac{dx}{dt}$  die Geschwindigkeit ist.

Unter diesen Annahmen verwandelt sich unsere Differentialgleichung I für die Schwingungen der Säule allein in

$$\text{V.} \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{2xg}{l} - \frac{o\varepsilon}{lq\sigma} \frac{dx}{dt}$$

und die Gleichung IV für die Wirkung nach dem Aufsetzen der Kugeln wird:

$$\text{VI.} \quad \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{xg}{l} \left[ 2 + zhq \frac{(V_1 + V_2)}{V_1 \cdot V_2} \right] - \frac{o\varepsilon}{lq\sigma} \frac{dx}{dt}$$

Schreite ich zur Integration von V und VI, so zeigen beide die allgemeine Gestalt:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -a \frac{dx}{dt} - bx,$$

wo bekanntlich eine Exponentialfunction den Werth von  $x$  liefert, also

$$x = e^{-\frac{at}{2}} \left( A \cos \frac{t}{T} \sqrt{b - \frac{a^2}{4}} + B \sin \frac{t}{T} \sqrt{b - \frac{a^2}{4}} \right)$$

Da es sich bei unserem Problem nur um die Schwingungsdauer handelt, übergehe ich die andern Grössen und behalte als Resultat nur die Gleichung  $\frac{\pi^2}{T^2} = b - \frac{a^2}{4}$ , wo also  $T$  die Schwingungsdauer der Säule,  $a$  und  $b$  die resp. Factoren der Gleichungen V und VI sind. Aus V folgt:

$$\text{VII.} \quad a = \frac{o\varepsilon}{lq\sigma} b = \frac{2g}{l} \text{ also: } \frac{\pi^2}{T^2} = \frac{2g}{l} - \frac{o^2 \varepsilon^2}{l^2 q^2 \sigma^2}$$

---

<sup>1)</sup> Stefan, Wien. Ber. XLVI. Helmholtz, eod. loco.

Aus VI ergibt sich:

$$a = \frac{0\varepsilon}{lq\sigma}$$

$$b = \frac{g}{l} \left[ 2 + \kappa h q \frac{(V_1 + V_2)}{V_1 \cdot V_2} \right], \text{ also wenn wir die}$$

Schwingungsdauer bei aufgesetzten beiden Kugeln  $T_2$  nennen.

$$\text{VIII.} \quad \frac{\pi^2}{T_2^2} = \frac{g}{l} \left[ 2 + \kappa h g \frac{(V_1 + V_2)}{V_1 \cdot V_2} \right] - \frac{0^2 \varepsilon^2}{l^2 q^2 B^2}.$$

Durch Divisionen von VII und VIII und nach einiger Umformung ergibt sich:

$$\left[ \left( \frac{T}{T_2} \right)^2 - 1 \right] \left[ 2 - \frac{0^2 \varepsilon^2}{l g l q^2 \sigma^2} \right] = \kappa h q \frac{(V_1 + V_2)}{V_1 \cdot V_2}$$

IX.

und

$$\kappa = \left[ \left( \frac{T}{T_2} \right)^2 - 1 \right] \left[ 2 - \frac{0^2 \varepsilon^2}{l g l q^2 \sigma^2} \right] \frac{V_1 \cdot V_2}{h q (V_1 + V_2)}.$$

Diese Gleichung ist für die Versuchsanordnung gültig, dass auf jeden Schenkel der Röhre eine Kugel aufgesetzt ist; lasse ich jedoch den einen Schenkel offen, so wird z. B.  $V_2 = \infty$ , und dann verwandelt sich Gleichung IX in

$$\text{X.} \quad \kappa = \left[ \frac{T^2}{T_1^2} - 1 \right] \left[ 2 - \frac{0^2 \varepsilon^2}{l g l q^2 \sigma^2} \right] \frac{V_1}{h g},$$

wo also  $T$  die Schwingungsdauer ohne Kugeln und  $T_1$  mit einer Kugel bezeichnet.

In dieser Form hat Assmann die Gleichung benutzt, nur dass er das Correctionsglied  $\frac{0^2 \varepsilon^2}{l g l q^2 \sigma^2}$  fortgelassen hat.

Als Constanten treten in Gleichung IX und X auf  $l q g \sigma V_1 V_2$ , welche ich direct messen konnte, während ich den Werth von  $\varepsilon$  aus frühern Untersuchungen als bekannt ansehen musste; in welcher Weise ich diese Werthe von  $\varepsilon$  verwendete, möge nun folgen.

## § 4.

Obgleich die Theorien der innern und äussern Reibung in Flüssigkeiten schon in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts von Poisson, Navier, Stokes, später von Neumann und Helmholtz behandelt sind, haben sich dieselben nur für wenige Probleme bisher praktisch durchführen lassen.

Die äussere Reibungsconstante für Glas und Quecksilber, die ich anzuwenden hatte, ist von Stefan<sup>1)</sup> als endliche Grösse ermittelt, während Warburg sie für Capillaren =  $\infty$  fand.

Ich entschloss mich daher, selbst Beobachtungen anzustellen und wählte für die Reibungsconstante  $\varepsilon$  die jetzt gebräuchlichen Einheiten:

mm. mgr. sec.

und zwar in absolutem Maasse.

Wenn ich unter den obigen Annahmen die Gleichungen von Stefan umforme, so ergibt sich

$$\frac{d^2x}{dt^2} = - \frac{2r^2\pi s g x}{r^2\pi s l} - \frac{2r\pi l \varepsilon}{r^2\pi s l} \frac{dx}{dt}$$

oder

$$\frac{d^2x}{dt^2} = - \frac{2gx}{l} - \frac{2\varepsilon}{rs} \frac{dx}{dt},$$

wo  $r$  der Radius der O-förmigen Glasröhre,  $s$  das specifische Gewicht des Quecksilbers,  $l$  die Länge der schwingenden Säule,  $2x$  die Niveaudifferenz der Kuppen des Quecksilbers nach dem Impulse ist. Die Lösung der Gleichung giebt

$T = \frac{\pi}{\sqrt{\frac{2g}{l} - \frac{\varepsilon^2}{r^2s^2}}}$ , wo  $T$  die einfache Schwingungsdauer nicht wie bei Stefan die Zeit einer Doppelschwingung ist. Es folgt:

$$\varepsilon = \sqrt{r^2s^2 \left( \frac{2g}{l} - \frac{\pi^2}{T^2} \right)}.$$

<sup>1)</sup> Stefan, Wien. Ber. XLVI.

<sup>2)</sup> Warburg. Wied. Ann. 1877 Bd. pag. 389.

Führe ich das Decrement  $\lambda$  ein, so ergibt sich:

$$\varepsilon = \frac{rs \lg. \text{nat. } \lambda}{T \lg. \text{nat. } e}.$$

Ich habe also 2 Formeln zur Bestimmung von  $\varepsilon$

- 1)  $\varepsilon = \sqrt{r^2 s^2 \left( \frac{2g}{l} - \frac{\pi^2}{T^2} \right)}$ , wenn  $T$  beobachtet ist,
- 2)  $\varepsilon = \frac{rs \lg. \lambda}{T \lg. e}$ , wenn ausserdem das Decrement  $\lambda$  bekannt ist.

Meine Beobachtungen sind folgende:

Ebenso wie später bei meiner Hauptaufgabe wendete ich hier zur Bestimmung der Schwingungsdauer einen electricen Registrir-Apparat an, dessen 2 Schreibstifte nahe bei einander stehen und auf demselben Papierstreifen ihre Zeichen machen. Der eine Stift giebt durch seine Punkte die einzelnen Secunden einer Uhr an, der andere die Schwingungszeit  $T$  der Quecksilbersäule. Das Schliessen der Kette im letzteren Falle geschah durch 2 Platindrähte, welche in der Ruhelage des Apparats die Kuppen der Säule berührten, und nach dem Impulse also den jedesmaligen Durchgaug durch die Ruhelage bezeichneten. Zur Berechnung von  $T$  mass ich die betreffenden Entfernungen der Punkte auf dem Papierstreifen mit einer Glasscala, und erhielt dann durch Division der Entfernung der Secundenpunkte in diejenige der Punkte der Schwingungsdauer den Werth von  $T$  in Secunden ausgedrückt.

Die Beobachtung von  $\lambda$  geschah dadurch, dass ich eine Glasscala an der Röhre befestigte und die Amplituden der Säule durch ein Fernrohr ablas.

Auf diese Art habe ich Glasröhren von verschiedenem Radius und Quecksilbersäulen von verschiedener Länge untersucht.

Ich erhielt als Mittelwerthe vielfacher Beobachtungen:

| r<br>Radius<br>der<br>Glasröhre<br>in mm | l<br>Länge<br>der Säule<br>in mm | t<br>Schwin-<br>gungs-<br>dauer<br>in Sec. | log. $\lambda$ | $\varepsilon$ | Bemerkungen                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 4,35                                     | 659,3                            | 0,5284                                     | 0,13050        | 33,527        | Die Tem-<br>peratur war<br>17,3° C. = $\vartheta$ |
| 4,35                                     | 322,7                            | 0,4040                                     | 0,09953        | 33,444        |                                                   |
| 4,35                                     | 229,4                            | 0,3404                                     | 0,08919        | 33,570        |                                                   |
| 4,10                                     | 200,1                            | 0,3178                                     | 0,00324*       | 32,400        |                                                   |
| 4,10                                     | 126,3                            | 0,2523                                     | 0,06530*       | 31,482        |                                                   |
| 6,70                                     | 765,7                            | 0,6221                                     | 0,09539        | 32,065        | s = spec. Gew.<br>d. Hg = 13,553                  |
| 7,90                                     | 284,9                            | 0,3788                                     | 0,05026        | 32,711        |                                                   |
| 7,90                                     | 200,9                            | 0,3181                                     | 0,04506*       | 34,931        |                                                   |
| 4,35                                     | 440,7                            | 0,4726                                     | 0,11966        | 34,355        | $\vartheta = 20,5^{\circ}$ C.                     |
| 7,90                                     | 310,4                            | 0,4140                                     | 0,05381        | 32,045        |                                                   |
| 6,70                                     | 897,2                            | 0,6737                                     | 0,10385        | 32,213        |                                                   |
| 6,70                                     | 1076,0                           | 0,7386                                     | 0,11641        | 33,935        | s = 13,546                                        |
| 7,90                                     | 250,5                            | 0,3558                                     | 0,04800*       | 33,240        |                                                   |
| 6,70                                     | 1210,0                           | 0,7834                                     | 0,13425        | 33,496        |                                                   |

Mittelwerth 33,244

Aus dieser Tabelle vermag ich keine Variabilität der Constante  $\varepsilon$  mit der Länge  $l$  oder dem Radius  $r$  zu constatiren. Die Werthe von  $\varepsilon$  sind nach den Formeln 1 und 2 pag. 9 abwechselnd berechnet, und zwar, wenn ich das Decrement beobachten konnte, nach 2; war mir dieses wegen der kurzen Schwingungsdauer unmöglich, so wendete ich 1 an und berechnete das Decrement aus der Gleichung  $\lg \lambda = \frac{\varepsilon \lg. e t}{r \cdot s}$ .

Letzteres geschah bei den mit einem Stern bezeichneten Zahlenwerthen.

Als Mittelwerth aller meiner Beobachtungen zusammen, folgt

$$\varepsilon = 33,244 \text{ bei } 18,5^{\circ} \text{ C.}$$

wobei sich als wahrscheinlicher Fehler des Resultats

$$\pm 0,6745 \sqrt{\frac{19,68896}{14 \cdot 13}} = \pm 0,2218.$$

ergibt.

Der Vergleich meines Werthes mit den von Stefan angegebenen ergibt eine Abweichung von einiger Grösse, denn nach Umformung jener Angaben erhalte ich in den von mir gewählten Einheiten

| r    | l     | t    | $\varepsilon$ |
|------|-------|------|---------------|
| 4,82 | 176,6 | 0,63 | 32,86         |
|      |       | 0,62 | 35,01         |
|      |       | 0,60 | 33,25         |
|      |       | 0,60 | 36,97         |
|      |       | 0,61 | 35,60         |

Mittelwerth = 34,74

für 18° C., wobei ich für Wien  $g = 9,80832$  m setzte.

Ich halte meinen Werth deshalb für wahrscheinlicher, weil er aus einer bedeutenderen Anzahl von Versuchen bei verschiedenen Längen der Säulen und Radien resultirt. Neuerdings hat Th. Schmidt aus Schwingungsbeobachtungen von Scheiben diese Constante  $\varepsilon = 33,092$  gefunden, welcher Werth von meinem nur um 0,5 % abweicht.

Hiernach glaubte ich  $\varepsilon = 33,244$  für meine andere Aufgabe benutzen zu können.

### § 5.

Die Construction meines Apparates stimmt im Wesentlichen mit der von Assmann\*) angegebenen überein, jedoch wendete ich nicht Eisen, sondern Glas zur Herstellung an.

Die 0-förmige Glasröhre AB ist an ihren beiden Schenkeln mit Schlifren versehen, so dass die beiden Kugeln  $V_1$  und  $V_2$  sich leicht aufsetzen und entfernen lassen. An die beiden Schenkel sind die Hähne d und e angeschmolzen, während auf dem entgegengesetzten Punkte der Peripherie die Platin-drähte i und i<sup>1</sup> durch Siegellack eingekittet wurden. Zwischen die Hähne d und e wurde durch Gummischläuche die Röhre c gefügt, an welche die Röhren a, b und das Manometer f

\*) Pgg. Ann. 1852, 1.

angeschmolzen waren. Um den Apparat evacuiren zu können, wurde a mit einer Wasserluftpumpe verbunden, b diente zur Einleitung der zu untersuchenden Gase und Dämpfe. Jene wurden durch Kautschuckschläuche direct aus dem Entwicklungs-Apparat nach b geführt, diese entwickelten sich in einem kleinen Fläschchen, welches angefüllt mit der betreffenden Flüssigkeit luftdicht an b gefügt war. In die Röhre AB wurde reines Quecksilber gegossen, dessen Kuppen die Enden der Platindrähte i und i' berührten, welche mit dem electrischen Registrir-Apparat in Verbindung gebracht waren.

Der ganze beschriebene Apparat war auf einem Brett befestigt, welches um eine horizontale eiserne Axe in Schwingungen versetzt werden konnte. (Cfr. die Tafel.)

Um stets dieselbe Ruhelage zu erhalten und zugleich nur das Quecksilber in der O-förmigen Röhre schwingen zu lassen, hatte ich am Fussboden eine Schraube befestigt, gegen die der Apparat durch ein seitlich angebrachtes Gewicht gedrückt wurde. Auf der andern Seite war eine Schnur angebunden, welche ich über mehrere Rollen bis zu meinem Beobachtungsplatze leitete, so dass ich durch einen Zug an dieser dem Brett eine seitliche Bewegung ertheilen konnte, die durch das Gewicht an der anderen Seite sogleich wieder vernichtet wurde, während das Quecksilber in der Röhre dem Impulse folgend in seiner Bewegung verharrte, bis es durch die entgegengesetzt wirkenden Kräfte nach etwa 50 Schwingungen in seine Ruhelage zurückgeführt war.

Die Berechnung der in meiner Gleichung IX oder X vorkommenden Grössen geschah folgendermassen:

Als Constanten erscheinen  $\varepsilon$  o g l q  $\sigma$   $V_1$   $V_2$  als Variable T  $T_2$   $T_1$  h.

Da während meiner Beobachtungen die Röhre AB leider einige Mal gesprungen ist, will ich hier nur die Werthe für den Apparat angeben, mit dem ich zuletzt beobachtet habe, und werde ich die anderen Angaben bei der Besprechung der betreffenden Gase mittheilen.

Ich nahm

$\epsilon$  die Constante der Reibung zwischen Glas und Quecksilber = 33,244,

$g$  die Beschleunigung der Schwerkraft nach den gleichzeitigen Beobachtungen von O. Beling\*) = 9,8114 m,

$\sigma$  die Dichte des Hg. = 13,553 bei 17° C. für H<sub>2</sub>O bei 4° = 1.

$q$  der Querschnitt der Röhre AB an den Niveaustellen der Hgsäule und innerhalb des Schwingungsgebietes, wurde an 2 kleinen Theilen der Röhre bestimmt, die ich mir vor dem Anschmelzen der Schlitze hatte abschneiden lassen. Ich fand auf der einen Seite

$$q = 4,0471 \text{ cm}, \text{ auf der anderen}$$

$$q = 3,9056 \text{ cm, als das Mittel}$$

$$q = 3,9763 \text{ cm.}$$

Die Radien betragen

$$r = 11,35 \text{ mm}$$

$$r = 11,15 \text{ mm im Mittel}$$

$$r = 11,25 \text{ mm.}$$

Um  $l$  die Länge der Quecksilbersäule zu finden, mass ich nach dem Einkitten der Platindrähte das Volumen der Röhre bis zu den Spitzen der Drähte durch Wasser mittelst einer Pipette aus und dividirte die Zahl durch den Wert von  $q$ , es war dann

$$l = 101,5 \text{ cm}$$

$o$  die Oberfläche der Quecksilbersäule berechnete ich nach der Formel

$$o = 2 r \pi l = 714,56 \text{ cm.}$$

$V_1$  und  $V_2$  sind Volumina der beiden Kugeln nebst den betreffenden Stücken der Röhre AB,\*) welche von den Enden der Röhre bis zu den Kuppen der Quecksilbersäule reichen.  $V_1$  und  $V_2$  bestimmte ich durch Wägung mit H<sub>2</sub>O und ausserdem durch Ausmessen mittelst der Pipette, ich erhielt:

\*) Inaugural-Dissertation. Breslau 1881.

\*) Die Volumina der kleinen seitlichen Röhren bis zu den Hähnen  $d$  und  $e$  sind hierin schon mitenthaltten.

$$V_1 = 1180,95 \text{ ccm}$$

$$V_2 = 1162,80 \text{ ccm.}$$

In meinen Formeln IX und X tritt das Verhältniss von 2 Schwingungsdauern  $\frac{T}{T_2}$  und  $\frac{T}{T_1}$  auf.

Die Bestimmung von T der Schwingungsdauer der Quecksilbersäule bei offenen Schenkeln,  $T_1$  derjenigen, wenn ein Schenkel durch die Kugel geschlossen war,  $T_2$  der, falls beide Kugeln aufgesetzt waren, geschah ebenso wie bei meinen Reibungsbeobachtungen und ist dort schon angegeben pag. 9. Hier will ich noch erwähnen, dass ich diese Grössen  $T$   $T_1$   $T_2$  bis auf die Tausendstel einer Secunde genau erhalten habe, wie die als Beispiel pag. 19 angeführte Rechnung beweist.

Da ich die Abhängigkeit von der Temperatur für  $\alpha$  beobachten wollte, die Grösse meines Apparats aber nicht gestattete, ihn allein in einem abgesonderten Raume zu erwärmen, so variierte ich die Temperatur des Zimmers; und zwar bewirkte ich Abkühlung dadurch, dass ich im Winter die Fenster während der Nacht geöffnet liess und dann am folgenden Tage Versuche anstellte, oder dass ich im Frühling bei geöffnetem Fenster vor Sonnenaufgang beobachtete. Die Erwärmung des Zimmers geschah durch Luftheizung und einen Hofmann'schen Gasofen, wodurch ich im Maximum 50° C. erhielt.

Zum Messen der Temperatur  $\vartheta$  verwandte ich ein zwischen die Kugeln  $V_1$  und  $V_2$  gesetztes Thermometer, später jedoch führte ich in jede Kugel ein kleines Thermometer auf einem Glasstative ein. (Cfr. Figur.)

Zur Variation des Druckes diente eine Wasserluftpumpe, welche mit der Röhre a in Verbindung stand. Da die Construction des Apparats die Anwendung von mehr als einer Atmosphäre ausschloss, so konnte ich nur kleinere Drucke benutzen. Die Ablesung geschah an dem Manometer f, für dessen Skala ich mir eine Correctionstabelle hergestellt hatte, und ich fand die Grösse h in meiner Formel aus dem abgelesenen Barometerstande H und der Angabe des Mano-

meters  $h_1$  gleich:  $h = H \pm h_1$ . Hierbei wurde natürlich  $H$  auf die Temperatur  $\vartheta$  reducirt, welche bei dem betreffenden Versuche in den Kugeln herrschte.

## § 6.

Um nun die Wirksamkeit dieses Apparates zu prüfen, stellte ich zunächst Beobachtungen mit Luft an, für welche ich  $\kappa = 1,410$  finden zu müssen glaubte. Da ich aber abweichende Zahlen erhielt, vermuthete ich einen Fehler in dem Correctionsgliede  $\frac{18 q^2 \sigma^2}{o^2 \varepsilon^2}$ , wo trotz aller Vorsicht doch wohl bei der numerischen Bestimmung dieser Grössen geringe Fehler nicht zu vermeiden sind, die sich aber durch die Multiplication zu einem bedeutenden Einfluss vereinigen können.

Deshalb führte ich statt jenes Gliedes nun das logarithmische Decrement ( $\lambda$ ) ein, aus welchem in § 4 die Grösse  $\varepsilon$  berechnet wurde.

Die Berechnung von  $\lambda$  geschah wie früher aus den Amplituden, die ich mit Hilfe des Fernrohres und der Glas-scala  $w$  beobachtete.

Bezeichne ich mit  $T$  die berechnete Schwingungsdauer, mit  $t$  die reducirt und mit  $\lambda$  das Decrement, so wird:

$$\frac{\pi^2}{T^2} = \frac{\pi^2}{t^2} - \left( \frac{\lambda}{T} \text{ Modul} \right)^2 \text{ oder}$$

$$t^2 = T^2 \left( \frac{\pi^2 + \lambda^2 \text{ Modul.}^2}{\pi^2} \right),$$

wo der Modul = 2,30258 zu setzen ist.

Die Werthe für  $T$  und  $\lambda$  liessen sich ziemlich sicher bestimmen, da die Hgssäule ca. 50 Einzelschwingungen ausführte, aus welchen die Mittelwerthe für  $T$  und  $\lambda$  berechnet wurden.

Führe ich nun  $t$  in meine Formeln IX und X ein, so wird

$$\text{XI. } \kappa = \left[ \frac{T^2 \cdot \frac{\pi^2 + \text{Mod.}^2 \lambda_2^2}{\pi^2 + \text{Mod.}^2 \lambda^2} - 1 \right] \frac{2 V_1 \cdot V_2}{q h (V_1 + V_2)}$$

und

$$\text{XII. } \kappa = \left[ \frac{T^2 \cdot \frac{\pi^2 + \text{Mod.}^2 \lambda_1^2}{\pi^2 + \text{Mod.}^2 \lambda^2} - 1 \right] \frac{2 V}{q h}$$

Im Verlauf der Beobachtungen zeigte sich bald, dass das Correctionsglied  $\frac{\pi^2 + \text{Mod.}^2 \lambda_1^2}{\pi^2 + \text{Mod.}^2 \lambda^2}$  den Werth des Verhältnisses  $\frac{T^2}{T_2^2}$  und  $\frac{T^2}{T_1^2}$  so wenig änderte, dass es völlig unberücksichtigt bleiben konnte. Den besten Beweis liefern die Resultate der einzelnen Zahlen für  $\alpha$  bei den betreffenden Gasen, welche stets ohne  $\lambda$  berechnet sind und meistens nicht um 1 % abweichen.

Um aber direct zu zeigen, dass dieses Glied innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler liegt, will ich folgende Ziffern anführen:

$$\text{Es war: } T = 0,74913, \lambda = 0,0322$$

$$T_2 = 0,64877, \lambda_2 = 0,0275,$$

dann ergibt sich

$$\alpha = 1,4084,$$

und ohne Berücksichtigung von  $\lambda$  und  $\lambda_2$ :

$$\alpha = 1,4091.$$

Ferner wird:

$$t = 0,74890$$

$$t_2 = 0,64871.$$

Hiernach differiren die Werthe von  $\alpha$  um 0,0007, und diejenigen von  $T$  mit  $t$  um 0,00023 sec.

$T_2$  mit  $t_2$  um 0,00006 sec.

Da ich aber  $T$  und  $T_2$  nur bis auf Tausendstel genau finden konnte, so liegen diese Abweichungen völlig in den Grenzen der Beobachtungsfehler, und das Fortlassen von  $\lambda$  ist gestattet.

Für die Bestimmung der Schwingungsdauern  $T$   $T_2$   $T_1$  wendete ich, wie schon angeführt ist, den Registrir-Apparat an, hierbei zeigten sich Funken an den Enden der beiden Platindrähte  $i$  und  $i^1$  bei der jedesmaligen Unterbrechung des Stromes durch die schwingende Hgssäule, deshalb musste ich prüfen, ob jene Funken nicht eine merkbare Wärmemenge erzeugten und dadurch meine Resultate fehlerhaft machten.

Hierzu construirte ich folgenden Apparat:

In eine kleine U-förmige Röhre wurden zwei Platindrähte eingeschmolzen und mit Quecksilber gefüllt, bis das Ende des Drahtes i gerade die Kuppe des Hg. berührte, während der Draht i<sup>1</sup> einige Millimeter eintauchte. Der eine Schenkel der Glasröhre wurde dann durch eine Kautschukmembran luftdicht geschlossen, der andere rechtwinklig umgebogen und in ihn eine Capillarröhre eingekittet. Die Platindrähte waren mit einer galvanischen Batterie verbunden, deren Strom jedesmal unterbrochen wird, sobald ich auf die Membran m mit dem Finger keinen Druck ausübte, weil dann die Hg.-Säule in ihre Ruhelage zurückkehrte, während sie durch das Auflegen des Fingers aus ihr entfernt war. So konnte ich leicht eine beliebige Anzahl von Unterbrechungen, folglich auch von Funken in dem Schenkel a hervorrufen. In der Capillarröhre schloss ein Tropfen Alkohol das Volumen des Schenkels a ab, und nach dem Princip des elektrischen Thermometers von Riess hätte eine Temperaturerhöhung durch die Funken eine Verschiebung des Tropfens bewirken müssen.

Die ganze U Röhre nebst einem Theil der Capillare erhielt eine Umhüllung von Watte, um den Wärmeausgleich mit der Umgebung möglichst zu vermeiden.

Obleich ich öfter je 200—300 Funken überspringen liess, war keine Ausdehnung der Luft des Schenkels a sichtbar, und glaubte ich demnach keinen Fehler zu begehen, wenn ich bei dem Hauptapparat den elektrischen Strom zur Bestimmung der Schwingungsdauer verwendete.

Aus dem bisher Angeführten geht also hervor, dass bei meiner Versuchsanordnung die Gleichungen XI und XII sich auf die Form

$$\kappa = \left( \frac{T^2}{T_1^2} - 1 \right) \frac{2V}{q h} \text{ und } \kappa = \left( \frac{T^2}{T_2^2} - 1 \right) \frac{2 V_1 \cdot V_2}{q h (V_1 + V_2)}$$

bringen lassen und allen Anforderungen der Genauigkeit genügen.

Bevor ich nun die Resultate für die einzelnen Gase und Dämpfe mittheile, werde ich an einem Beispiel die Art der Verwendung der beobachteten Grössen angeben.



Deshalb wurden nur 8—12 Angaben des Papierstreifens aus der Mitte einer Periode verwendet, wenn unter Periode die gesammte Zahl der Schwingungen nach einem Impulse verstanden wird.

Die Endwerthe von T resultiren aus den Ziffern von 3—5 solchen Perioden, welche zu einem schliesslich Mittelwerthe vereinigt wurden.

Bei dem Versuche mit Aldehyd ist also das Verfahren folgendermaassen:

|         | $z_n - z_0$ | $n(z_n - z_0)$ |
|---------|-------------|----------------|
| $z_0 =$ | 0,0824      |                |
| $z_1 =$ | 0,7652      | 0,6828         |
| $z_2 =$ | 0,4470      | 1,3646         |
| $z_3 =$ | 2,1306      | 2,0482         |
| $z_4 =$ | 2,8166      | 6,1446         |
| $z_5 =$ | 2,7342      | 10,9368        |
| $z_6 =$ | 3,4948      | 17,0620        |
| $z_7 =$ | 4,1791      | 24,5802        |
| $z_8 =$ | 4,8600      | 33,4432        |
|         | 5,4624      | 43,6992        |
| addirt: |             | 24,5789        |
|         |             | 139,2780       |

Hier ist  $n = 8$  also

$$\sum n (z_n - z_0) = 139,2780$$

$$\frac{n}{2} \sum (z_n - z_0) = 98,3156 \text{ subtrahirt}$$

$$40,9624 = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{12} T$$

T = 0,682707 Sekunden.

Die zweite Periode war:

|         | $z_n - z_0$ | $n(z_n - z_0)$ |
|---------|-------------|----------------|
| $z_0 =$ | 0,1112      |                |
| $z_1 =$ | 0,7933      | 0,6821         |
| $z_2 =$ | 1,4752      | 1,3640         |
| $z_3 =$ | 2,1580      | 2,7280         |
| $z_4 =$ | 2,8421      | 6,1404         |
| $z_5 =$ | 2,7309      | 10,9236        |
| $z_6 =$ | 3,4117      | 17,0585        |
| $z_7 =$ | 4,0946      | 24,5676        |
| $z_8 =$ | 4,7792      | 33,4544        |
|         | 5,4628      | 43,7024        |
|         |             | 24,5721        |
|         |             | 139,2570       |
|         |             | 98,2884        |

$$60 T = 40,9686$$

T = 0,68281 Sekunden.

2\*

Die dritte Periode war:

|         | $z_n - z_0$ | $n(z_n - z_0)$ |
|---------|-------------|----------------|
| $z_0 =$ | 0,0258      |                |
| $z_1 =$ | 0,7080      | 0,6822         |
| $z_2 =$ | 1,3893      | 1,3635         |
| $z_3 =$ | 2,0721      | 2,0463         |
| $z_4 =$ | 2,7548      | 2,7290         |
| $z_5 =$ | 3,4363      | 3,4105         |
| $z_6 =$ | 4,1203      | 4,0945         |
| $z_7 =$ | 4,8013      | 4,7761         |
| $z_8 =$ | 5,4849      | 5,4591         |
|         | <hr/>       | <hr/>          |
|         | 24,5612     | 139,1891       |
|         |             | 98,2448        |
|         |             | <hr/>          |
|         | 60 T =      | 40,9443        |

$T = 0,682405$  Sec.

Als Mittelwerth von T ergibt sich aus

$$\begin{array}{r}
 T = 0,682707 \\
 0,682810 \\
 \hline
 0,682405 \\
 3 T = 2,047922 \\
 T = 0,682640
 \end{array}$$

Aus den 3 Werthen von T geht hervor, dass die dritte Decimalstelle noch als richtig angesehen werden kann.

Kehren wir zur Beobachtung mit Aldehyd zurück, so finden sich folgende Zahlen:

$$\begin{array}{l}
 T = 0,74776 \text{ Sec.} \\
 T_2 = 0,68264 \text{ Sec.}
 \end{array}$$

Der abgelesene Barometerstand war  $H = 28' 6,14''$  bei  $13,3^0$  R, also der reducirte  $H = 77,25$  cm bei  $21,7^0$  C.

Der Manometerstand war  $h_1 = 25,37$  cm, folglich wird die Höhe der Quecksilbersäule, welche dem Drucke im Apparat entspricht:

$$h = H - h_1 = 51,88 \text{ cm, } \vartheta \text{ ergab sich } 22,7^0 \text{ C.}$$

Setzen wir diese Werthe in unsere Formel XIV

$$h = \left( \frac{T^2}{T_2^2} - 1 \right) \frac{2 V_1 V_2}{q h (V_1 + V_2)}; \text{ so ist}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \lg \frac{T^2}{T_2^2} - 1 & = & 0,30079 - 1 \\
 \lg \frac{V_1 + V_2}{(V_1 + V_2)g} & = & 2,46721 \\
 \lg h & = & 1,71500 \\
 \lg \kappa & = & 0,05300
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{rcl}
 \lg T & = & 0,87376 - 1 \\
 \lg T_2 & = & 0,83419 - 1 \\
 \hline
 & & 0,03957 \\
 \lg \frac{T^2}{T_2^2} & = & 0,07914 \\
 \lg \frac{T^2}{T_2^2} - 1 & = & 0,19989 \\
 \kappa & = & 1,130.
 \end{array}$$

Hiernach mögen nun die Resultate für die beobachteten Gase und Dämpfe folgen.

### § 8.

Es mag hier noch die allgemeine Bemerkung eingeschaltet werden, dass der Apparat vor der Beobachtung mehrere Mal, meistens 3—4 Mal, mit dem betreffenden Gase gefüllt und wieder evacuirt wurde, so dass eine ungehörige Beimischung eines andern Stoffes, der etwa vorher untersucht war, nicht möglich gewesen ist.

In den folgenden Tabellen enthält die erste Columnne das Datum des Beobachtungstages, die zweite die Schwingungsdauer  $T$  bei offenen Schenkeln, die dritte den Werth  $T_2$  bei geschlossenen Schenkeln, die vierte die Temperatur  $\vartheta$  innerhalb der Kugeln, die fünfte die dem Druck entsprechende Quecksilberhöhe und die letzte den resultirenden Werth von  $\kappa$  dem Verhältniss der beiden specifischen Wärmen.

### Luft.

Von der grossen Zahl der angestellten Versuche will ich nur die folgenden mittheilen, welche eine genügende Uebersicht über  $\kappa$  geben, zumal auch die anderen Beobachtungen dieselben Werthe zeigen und nur dienen, zu prüfen, ob nach der Untersuchung eines Stoffes die Brauchbarkeit des Apparates irgendwie gelitten hätte.

Für Luft war:

Tabelle I.<sup>1)</sup>

| Datum       | T sec.  | T <sub>2</sub> sec. | θ °C | h cm  | κ     |
|-------------|---------|---------------------|------|-------|-------|
| 26. 9. 81.  | 0,63070 | 0,54341             | 22,0 | 76,98 | 1,412 |
|             |         | 0,57210             |      | 48,30 | 1,396 |
| 29. 9. 81.  | 0,62876 | 0,54281             | 13,5 | 75,95 | 1,408 |
|             |         | 0,56712             |      | 51,55 | 1,392 |
| 1. 10. 81.  | 0,63170 | 0,54560             | 14,0 | 76,32 | 1,397 |
|             |         | 0,57534             |      | 45,95 | 1,401 |
| 30. 9. 81.  | 0,62995 | 0,54577             | 13,5 | 76,44 | 1,393 |
|             |         | 0,58133             |      | 38,75 | 1,408 |
| 1. 10. 81.  | 0,63006 | 0,54318             | 12,0 | 76,32 | 1,416 |
| 5. 10. 81.  | 0,63184 | 0,54666             | 16,0 | 74,81 | 1,406 |
| 19. 10. 81. | 0,63117 | 0,54548             | 17,0 | 75,75 | 1,401 |
| 22. 10. 81. | 0,63481 | 0,54842             | 10,7 | 75,09 | 1,414 |
| 7. 11. 81.  | 0,63097 | 0,54550             | 16,5 | 75,95 | 1,394 |
| 12. 11. 81. | 0,63066 | 0,54612             | 18,5 | 74,20 | 1,407 |
| 3. 12. 81.  | 0,74842 | 0,64429             | 16,4 | 73,12 | 1,401 |
|             |         | 0,67391             |      | 61,75 | 1,401 |
|             |         | 0,69252             |      | 35,09 | 1,410 |
| 15. 12. 81. | 0,74844 | 0,64318             | 16,5 | 74,96 | 1,392 |
|             |         | 0,65525             |      | 64,18 | 1,399 |
|             |         | 0,67104             |      | 50,86 | 1,413 |
| 19. 1. 82.  | 0,74926 | 0,64322             | 19,2 | 74,54 | 1,411 |
| 7. 2. 82.   | 0,74571 | 0,64438             |      | 70,89 | 1,403 |
|             |         | 0,66525             |      | 53,30 | 1,411 |
| 25. 3. 82.  | 0,74913 | 0,64877             | 14,8 | 69,35 | 1,409 |
|             |         | 0,66401             |      | 56,50 | 1,416 |
|             |         | 0,68071             | 14,7 | 44,30 | 1,397 |
|             |         | 0,69546             |      | 33,40 | 1,407 |
|             |         | 0,67077             | 14,8 | 51,30 | 1,413 |

Mittelwerth 1,4046

Während der Beobachtungen vom

26. 9. 81 bis 12. 11. 81 war  $V_1 = 1221,5 \text{ ccm}$ und  $q = 3,856 \square \text{ cm}$  . . .  $V_2 = 1194,6 \text{ „}$ 3. 12. 81 bis 19. 1. 82 . . .  $V_1 = 1180,95 \text{ ccm}$ und  $q = 3,9763 \square \text{ cm}$  . . .  $V_2 = 1162,80 \text{ „}$ 7. 2. 82 bis 25. 3. 82. . . .  $V_1 = 1175,60 \text{ „}$ und  $q = 3,9763 \square \text{ cm}$  . . .  $V_2 = 1156,50 \text{ „}$ 

<sup>1)</sup> An den Stellen, wo in den Tabellen Zahlenangaben in einigen Columnen fehlen, gelten die nächst vorherstehenden Ziffern auch für die folgenden Beobachtungen.

Die verwendete Luft war durch eine Flasche mit Kalilauge, eine solche mit concentrirter Schwefelsäure und ein Rohr mit Chlorcalcium geleitet worden.

Der gefundene Werth  $\alpha = 1,4046$  erscheint etwas kleiner als der sonst beobachtete 1,410, stimmt jedoch mit demjenigen von Röntgen 1,405 gut überein und weicht auch von den früheren Beobachtungen nicht bedeutend ab.

Eine Abhängigkeit des  $\alpha$  von der Temperatur oder dem Druck kann ich aus der Tabelle nicht schliessen, was ja auch mit den sonst bekannten Eigenschaften der Luft übereinstimmt.

### Sauerstoff $O_2$ .

Er wurde aus chloresurem Kali und Mangansuperoxyd entwickelt und durch Chlorcalcium und Schwefelsäure getrocknet.

Tabelle II.

$$V_1 = 1221,5 \text{ ccm} \quad V_2 = 1194,6 \text{ ccm} \quad q = 3,856 \square \text{ cm}$$

| Datum      | T       | $T_2$   | $\vartheta$ | h     | $\alpha$ |
|------------|---------|---------|-------------|-------|----------|
| 2. 12. 81. | 0,74721 | 0,64433 | 16,3        | 72,43 | 1,403    |
|            |         | 0,65238 |             | 65,23 | 1,409    |
|            |         | 0,66166 |             | 57,96 | 1,400    |
|            |         | 0,67109 | 16,0        | 50,58 | 1,397    |
|            |         | 0,68314 |             | 41,56 | 1,393    |
|            |         | 0,68927 | 16,4        | 36,72 | 1,406    |
| 3. 12. 81. | 0,74754 | 0,69643 |             | 31,59 | 1,410    |
|            |         | 0,64324 | 20,5        | 73,73 | 1,401    |
|            |         | 0,65731 |             | 61,50 | 1,406    |
|            |         | 0,66452 | 20,4        | 55,93 | 1,399    |
|            |         | 0,67104 |             | 50,54 | 1,405    |
|            |         | 0,68527 | 20,6        | 39,96 | 1,401    |

Mittelwerth 1,4025

Diese Zahl stimmt sehr gut mit andern Beobachtungen überein, denn es fanden:

Regnault 1,402, Masson 1,401, Dulong 1,398.

Eine Variabilität mit Druck oder Temperatur ist nicht bemerkbar.

### Kohlensäure $\text{CO}_2$ .

Dieses Gas wurde entwickelt aus weissem schlesischem Marmor und Salzsäure, geleitet durch Flaschen mit Wasser, kohlensaurem Kali, schwefelsaurer Eisenlösung, durch 2 Flaschen mit einer Lösung von übermangansaurem Kali, und 6 Röhren mit Holzkohle, getrocknet durch conc. Schwefelsäure und Chlorcalcium.

Tabelle III.

| Datum       | T       | $T_2$   | $\vartheta$ | h     | z     |
|-------------|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 12. 5. 82.  | 0,74933 | 0,65140 | 17,1        | 75,20 | 1,260 |
|             |         | 0,65693 |             | 69,54 | 1,269 |
|             |         | 0,66655 | 16,8        | 61,24 | 1,266 |
|             |         | 0,67071 |             | 57,78 | 1,260 |
|             |         | 0,67810 |             | 51,20 | 1,266 |
|             |         | 0,68528 |             | 45,47 | 1,262 |
|             |         | 0,69107 |             | 40,73 | 1,265 |
|             |         | 0,69850 | 16,7        | 34,78 | 1,271 |
|             |         | 0,70960 | 16,6        | 26,55 | 1,272 |
| 13. 5. 82.  | 0,74970 | 0,65207 | 9,5         | 74,48 | 1,268 |
|             |         | 0,65873 |             | 68,34 | 1,267 |
|             |         | 0,66570 |             | 62,30 | 1,263 |
|             |         | 0,67074 | 9,4         | 57,72 | 1,267 |
|             |         | 0,67750 |             | 51,99 | 1,266 |
|             |         | 0,68535 |             | 45,59 | 1,265 |
|             |         | 0,69159 | 9,6         | 40,50 | 1,268 |
|             |         | 0,69947 |             | 34,63 | 1,260 |
| 12. 10. 81. | 0,63291 | 0,55370 | 33,0        | 75,89 | 1,265 |
|             |         | 0,56326 |             | 65,09 | 1,261 |
|             |         | 0,57218 |             | 55,19 | 1,268 |
|             |         | 0,58166 | 33,1        | 45,29 | 1,272 |
|             |         | 0,59267 |             | 34,79 | 1,261 |
| 14. 5. 82.  | 0,74971 | 0,64806 | 33,7        | 78,43 | 1,265 |
|             |         | 0,65344 |             | 73,50 | 1,262 |
|             |         | 0,66032 |             | 66,85 | 1,268 |
|             |         | 0,66782 |             | 60,40 | 1,263 |
|             |         | 0,67346 |             | 55,22 | 1,270 |
|             |         | 0,67911 | 33,4        | 50,82 | 1,262 |
|             |         | 0,68566 |             | 45,30 | 1,266 |
|             |         | 0,69453 |             | 38,46 | 1,260 |
|             |         | 0,70127 |             | 33,12 | 1,265 |
|             |         | 0,70836 |             | 27,82 | 1,267 |

Mittelwerth 1,2653

Hierbei war während der Beobachtungen vom 12. 10. 81

$$V_1 = 1221,5^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1194,6^{\text{ccm}} \quad q = 3,856 \square^{\text{cm}}$$

Die Werthe von  $\kappa$  zeigen im Maximum eine Abweichung von  $\frac{1}{2}\%$  und dürfte diese Tabelle für die Richtigkeit der Untersuchungsmethode überhaupt gewichtig sein.

Die Zahl  $\kappa = 1,2653$  ist in Uebereinstimmung mit andern Werthen; denn es fanden:

Regnault 1,268 und Masson 1,274, abweichende Resultate erhielten Cazin 1,291, Dulong 1,322 und Röntgen 1,305.

Woräuf diese Abweichungen beruhen, ist nicht abzusehen. Eine Aenderung des Werthes  $\kappa$  mit der Temperatur oder dem Drucke ist nicht sichtbar.

### Chlorwasserstoff HCl.

Er wurde entwickelt aus Steinsalz und Schwefelsäure, gewaschen durch  $\text{H}_2\text{O}$  und getrocknet durch  $\text{H}_2\text{SO}_4$  und  $\text{Ca Cl}_2$ .

Tabelle IV.

$$V_1 = 1175,6^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1156,50^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763 \square^{\text{cm}}$$

| Datum     | T       | T <sub>2</sub> | $\vartheta$ | h     | $\kappa$ |
|-----------|---------|----------------|-------------|-------|----------|
| 7. 3. 82. | 0,74622 | 0,63741        | 18,8        | 78,49 | 1,418    |
|           |         | 0,64756        |             | 68,65 | 1,401    |
|           |         | 0,65522        |             | 61,92 | 1,407    |
|           |         | 0,66338        | 18,9        | 55,61 | 1,401    |
| 8. 3. 82. | 0,74891 | 0,69051        |             | 34,76 | 1,417    |
|           |         | 0,64242        | 33,4        | 75,36 | 1,396    |
|           |         | 0,64735        |             | 71,62 | 1,385    |
|           |         | 0,65561        | 31,7        | 64,53 | 1,385    |
|           |         | 0,66255        | 31,2        | 58,10 | 1,401    |
|           |         | 0,67285        | 31,0        | 50,31 | 1,391    |
| 8. 3. 82. | 0,75202 | 0,68871        | 30,6        | 38,57 | 1,387    |
|           |         | 0,64279        | 41,0        | 76,19 | 1,396    |
|           |         | 0,67470        |             | 51,19 | 1,388    |
|           |         | 0,68623        |             | 42,19 | 1,399    |
|           |         | 0,69231        | 41,1        | 37,49 | 1,408    |
|           |         | 0,70098        |             | 32,00 | 1,381    |
|           |         | 0,70983        | 41,0        | 25,66 | 1,399    |

Mittelwerth 1,398

Dieser Werth weicht von den Beobachtungen Regnaults  $\alpha = 1,422$  ab, ist aber denjenigen Massons  $\alpha = 1,392$  fast gleich, und es ist mir die Ursache des Fehlers von c. 2,4% nicht bekannt.

### Bromwasserstoff HBr.

Er wurde entwickelt durch Auftropfen von Brom auf angefeuchteten rothen Phosphor, gewaschen durch Wasser, und durch eine Röhre mit feuchtem Phosphor und Glasherben sowie eine Chlorcalciumröhre geleitet.

Tabelle V.

$$V_1 = 1175,60^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1156,50^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763^{\square \text{cm}}$$

| Datum      | T       | T <sub>2</sub> | $\vartheta$ | h     | $\alpha$ |
|------------|---------|----------------|-------------|-------|----------|
| 24. 2. 82. | 0,75014 | 0,66015        | 10,3        | 63,92 | 1,363    |
|            |         | 0,66380        |             | 59,92 | 1,356    |
|            |         | 0,66525        | 10,1        | 58,41 | 1,363    |
|            |         | 0,67763        |             | 49,58 | 1,350    |
|            |         | 0,68542        |             | 42,86 | 1,353    |
| 23. 2. 82. | 0,75051 | 0,64678        | 18,8        | 75,24 | 1,351    |
|            |         | 0,65007        |             | 71,66 | 1,362    |
|            |         | 0,65691        |             | 65,13 | 1,371    |
|            |         | 0,67913        | 18,9        | 47,54 | 1,363    |
|            |         | 0,68584        |             | 42,53 | 1,361    |
| 25. 2. 82. | 0,75122 | 0,70378        |             | 29,47 | 1,365    |
|            |         | 0,65170        | 30,8        | 70,85 | 1,361    |
|            |         | 0,65630        |             | 66,54 | 1,367    |
|            |         | 0,66355        |             | 60,83 | 1,362    |
|            |         | 0,66840        |             | 56,42 | 1,368    |
| 25. 2. 82. | 0,75140 | 0,67516        | 30,5        | 50,96 | 1,370    |
|            |         | 0,68466        |             | 43,97 | 1,360    |
|            |         | 0,64802        | 37,8        | 74,12 | 1,363    |
|            |         | 0,65940        |             | 63,90 | 1,370    |
|            |         | 0,67200        |             | 53,72 | 1,366    |
|            |         | 0,68530        |             | 43,21 | 1,372    |
|            |         | 0,69218        |             | 39,19 | 1,366    |
|            |         | 0,70442        |             | 29,39 | 1,375    |

Mittelwerth 1,3647

Weil HBr bisher noch nicht in Betreff der Grösse  $\alpha$  untersucht ist, lässt sich über den Werth 1,3647 ein Vergleich nicht anstellen.

Die Abweichungen vom Mittel betragen 1% im Maximum und zeigen keine Regelmässigkeit, aus der sich eine Variabilität mit Druck und Temperatur folgern liesse.

### Schweflige Säure $\text{SO}_2$ .

Sie wurde entwickelt aus Kupfer und Schwefelsäure und geleitet durch Wasser und 2 Flaschen mit Schwefelsäure.

Tabelle VI.

$$V_1 = 1221,5^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1194,6^{\text{ccm}} \quad q = 3,856 \text{ } \square^{\text{cm}}$$

| Datum       | T       | $T_2$   | $\vartheta$ | h      | $\kappa$ |
|-------------|---------|---------|-------------|--------|----------|
| 26. 10. 81. | 0,63451 | 0,55585 | 17,5        | 75,023 | 1,265    |
|             |         | 0,56549 |             | 64,823 | 1,252    |
|             |         | 0,57403 |             | 55,223 | 1,258    |
|             |         | 0,59193 |             | 37,323 | 1,250    |
| 5. 11. 81.  | 0,63095 | 0,55181 | 15,5        | 76,886 | 1,252    |
|             |         | 0,56022 |             | 66,986 | 1,255    |
|             |         | 0,57005 |             | 56,486 | 1,248    |
|             |         | 0,57829 |             | 47,186 | 1,267    |
|             |         | 0,58828 |             | 37,586 | 1,252    |
|             |         | 0,59921 |             | 27,086 | 1,257    |
| 7. 11. 81.  | 0,63097 | 0,55234 | 16,5        | 75,953 | 1,258    |
|             |         | 0,56131 |             | 65,353 | 1,263    |
|             |         | 0,56992 |             | 56,153 | 1,259    |
| 8. 11. 81.  | 0,63105 | 0,54942 | 33,7        | 79,814 | 1,252    |
|             |         | 0,56212 |             | 65,414 | 1,246    |
|             |         | 0,57234 |             | 53,714 | 1,256    |
|             |         | 0,58028 |             | 45,114 | 1,268    |
|             |         | 0,60202 |             | 24,614 | 1,256    |

Mittelwerth 1,2563

Dieser Werth  $\kappa = 1,2563$  ist mit dem von Regnault gefundenen 1,256 congruent und differirt mit den Beobachtungen von Masson  $\kappa = 1,248$  und Cazin 1,262 nur um c. 0,7%, eine Grösse, die wohl unter die Beobachtungsfehler fallen dürfte.

Eine Veränderlichkeit mit Druck oder Temperatur ist nicht zu bemerken.

### Schwefelwasserstoff $\text{H}_2\text{S}$ .

$\text{H}_2\text{S}$  wurde hergestellt aus Schwefeleisen und verdünnter Schwefelsäure, geleitet durch Wasser, conc. Schwefelsäure und Chlorcalcium.

Tabelle VII.

$$V_1 = 1175,60^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1156,50^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763 \square^{\text{cm}}$$

| Datum      | T       | $T_2$   | $\vartheta$ | h     | $\alpha$ |
|------------|---------|---------|-------------|-------|----------|
| 10. 3. 82. | 0,74855 | 0,66299 | 17,4        | 63,00 | 1,279    |
|            |         | 0,67017 |             | 56,77 | 1,279    |
|            |         | 0,67554 |             | 51,98 | 1,285    |
|            |         | 0,68420 | 17,5        | 45,26 | 1,274    |
|            |         | 0,69963 |             | 33,37 | 1,272    |
| 13. 3. 82. | 0,74897 | 0,70940 | 10,3        | 25,90 | 1,284    |
|            |         | 0,65765 |             | 68,20 | 1,277    |
|            |         | 0,66317 |             | 62,99 | 1,282    |
|            |         | 0,67248 | 10,2        | 55,57 | 1,270    |
|            |         | 0,68012 |             | 49,01 | 1,272    |
| 10. 3. 82. | 0,74754 | 0,64756 | 30,3        | 76,74 | 1,271    |
|            |         | 0,65381 |             | 70,52 | 1,278    |
|            |         | 0,66195 |             | 63,48 | 1,272    |
|            |         | 0,67020 | 30,4        | 56,44 | 1,270    |
|            |         | 0,68643 |             | 42,70 | 1,279    |
|            |         | 0,69200 |             | 38,54 | 1,272    |
|            |         | 0,69887 |             | 33,31 | 1,271    |
| 15. 3. 82. | 0,74847 | 0,65448 | 39,5        | 71,36 | 1,279    |
|            |         | 0,66542 |             | 61,83 | 1,274    |
|            |         | 0,67501 |             | 53,20 | 1,283    |
|            |         | 0,70097 | 40,0        | 33,00 | 1,272    |
|            |         | 0,65722 |             | 69,03 | 1,276    |
|            |         | 0,66666 |             | 60,34 | 1,282    |
|            |         | 0,67356 |             | 55,00 | 1,270    |

Mittelwerth 1,2759

Diese Zahl weicht sowohl von dem Werthe Regnaults 1,312 als auch dem Massons 1,258 bedeutend ab, ist aber sehr nahe dem Mittelwerth beider. Eine Variation mit Druck oder Temperatur zeigt sich nicht.

### Schwefelkohlenstoff CS<sub>2</sub>.

Käuflicher Schwefelkohlenstoff wurde durch Schütteln mit Quecksilber gereinigt, dann destillirt und besass den Siedepunkt bei 46° C.

Tabelle VIII.

$$V_1 = 1175,60^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1156,50^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763 \text{ } \square \text{cm}$$

| Datum      | T       | T <sub>2</sub> | θ    | h     | κ     |
|------------|---------|----------------|------|-------|-------|
| 12. 3. 82. | 0,74923 | 0,71732        | 21,3 | 22,31 | 1,195 |
|            |         | 0,72467        |      | 16,99 | 1,189 |
|            |         | 0,71761        |      | 22,15 | 1,192 |
|            |         | 0,72398        |      | 17,34 | 1,199 |
| 12. 3. 82. | 0,74890 | 0,69673        | 29,8 | 39,64 | 1,184 |
|            |         | 0,69972        |      | 36,15 | 1,180 |
|            |         | 0,70688        | 30,0 | 30,36 | 1,182 |
|            |         | 0,71436        |      | 24,33 | 1,194 |
|            |         | 0,72239        | 30,2 | 18,29 | 1,198 |
|            |         | 0,70341        |      | 33,05 | 1,185 |
|            |         | 0,71167        | 30,0 | 26,36 | 1,194 |
|            |         | 0,72054        |      | 19,80 | 1,189 |
| 15. 3. 82. | 0,74891 | 0,68179        | 39,7 | 50,49 | 1,199 |
|            |         | 0,68955        |      | 44,63 | 1,180 |
|            |         | 0,69517        |      | 39,90 | 1,180 |
|            |         | 0,70346        | 39,8 | 33,15 | 1,180 |
|            |         | 0,68634        |      | 47,14 | 1,186 |
|            |         | 0,69233        | 39,7 | 42,16 | 1,188 |
|            |         | 0,69878        |      | 36,52 | 1,193 |

Mittelwerth 1,1890

Für diesen Dampf ist die Grösse κ bisher noch nicht bestimmt gewesen, der gefundene Werth 1,189 weicht von der nach Regnaults Beobachtungen berechneten Zahl 1,197 um 0,8% ab, jedoch finden sich in der Tabelle auch mehrere Werthe, die nur um 0,2% von jenem abweichen.

### Ammoniak NH<sub>3</sub>.

Er wurde entwickelt aus Salmiak und Aetzkalk, geleitet durch Wasser und Chlorcalcium.

Tabelle IX.

$$V_1 = 1221,5 \text{ ccm} \quad V_2 = 1194,6 \text{ ccm} \quad q = 3,856 \text{ cm}^3$$

| Datum       | T       | T <sub>2</sub> | θ    | h      | α     |
|-------------|---------|----------------|------|--------|-------|
| 14. 10. 81. | 0,63385 | 0,55488        | 17,0 | 75,647 | 1,262 |
|             |         | 0,56569        |      | 63,547 | 1,259 |
|             |         | 0,57400        |      | 54,347 | 1,264 |
|             |         | 0,58335        |      | 44,547 | 1,269 |
|             |         | 0,59402        |      | 34,547 | 1,259 |
| 20. 10. 81. | 0,63430 | 0,55547        | 18,0 | 75,515 | 1,260 |
|             |         | 0,56489        |      | 64,715 | 1,262 |
|             |         | 0,57367        |      | 55,015 | 1,267 |
| 22. 10. 81. | 0,63396 | 0,55450        | 10,7 | 75,795 | 1,269 |
|             |         | 0,56549        |      | 63,995 | 1,258 |
|             |         | 0,57421        |      | 54,295 | 1,263 |
| 23. 10. 81. | 0,63445 | 0,55601        | 30,1 | 75,045 | 1,261 |
|             |         | 0,56572        |      | 63,845 | 1,264 |
|             |         | 0,57581        |      | 53,245 | 1,259 |
|             |         | 0,58419        |      | 44,545 | 1,262 |
| 24. 10. 81. | 0,63310 | 0,55763        | 17,5 | 71,820 | 1,260 |
|             |         | 0,56468        |      | 64,020 | 1,258 |
|             |         | 0,57375        |      | 54,120 | 1,257 |
|             |         | 0,58346        |      | 44,020 | 1,261 |
|             |         | 0,59457        | 19,0 | 33,320 | 1,257 |
|             |         | 0,55511        |      | 74,360 | 1,266 |
|             |         | 0,57388        |      | 53,760 | 1,264 |
|             |         | 0,59399        |      | 34,460 | 1,257 |
|             |         | 0,55485        |      | 74,360 | 1,271 |
| 25. 10. 81. | 0,63403 | 0,56497        | 20,2 | 64,256 | 1,261 |
|             |         | 0,59439        |      | 34,056 | 1,267 |

Mittelwerth 1,2622

Der gefundene Werth 1,2622 weicht von den bisherigen Beobachtungen ebenso bedeutend ab, wie diese von einander, denn es erhielt

Regnault 1,300, Cazin 1,328, Masson 1,239.

Eine Veränderung mit Temperatur oder Druck findet nicht statt.

### Methan CH<sub>4</sub>.

Dieses Gas wurde durch Erhitzen eines Gemenges aus essigsauerm Natron und Natronkalk entwickelt und durch concentrirte Schwefelsäure, Wasser und Chlorcalcium geleitet.

Tabelle X.

$$V_1 = 1239,5^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1212,5^{\text{ccm}} \quad q = 3,856^{\square \text{cm}}$$

| Datum       | T       | T <sub>2</sub> | θ    | h      | α     |
|-------------|---------|----------------|------|--------|-------|
| 12. 11. 81. | 0,63066 | 0,54892        | 18,5 | 76,211 | 1,334 |
|             |         | 0,56028        |      | 65,811 | 1,290 |
|             |         | 0,57012        |      | 54,711 | 1,299 |
| 11. 11. 81. | 0,63064 | 0,54910        | 19,0 | 76,629 | 1,323 |
|             |         | 0,56792        |      | 55,629 | 1,331 |
|             |         | 0,58703        |      | 36,929 | 1,326 |
| 12. 11. 81. | 0,63074 | 0,55038        | 30,0 | 76,216 | 1,308 |
|             |         | 0,56026        |      | 64,896 | 1,309 |
|             |         | 0,58110        |      | 42,546 | 1,330 |
|             |         | 0,59757        |      | 27,646 | 1,311 |
|             |         | 0,61031        |      | 16,391 | 1,320 |

Mittelwerth 1,316

Eine gute Uebereinstimmung zeigt sich mit der Zahl von Masson 1,315, dagegen findet Regnault 1,265; die Abweichungen vom Mittel betragen ca. 1%.

### Methylehlrid $\text{CH}_3 \text{Cl}$ .

In eine kochende Lösung von Chlorzink in Methylalkohol wurde trockenes Salzsäuregas geleitet, das freie Methylchlorid gelangte durch einen Rückflusskühler und eine Flasche mit Wasser in einen Gasometer, und von dort durch ein Chlorcalciumrohr in den Apparat. (Werthe cfr. Tab. XI.)

Für die Richtigkeit dieses Werthes spricht der Umstand, dass die Abweichungen der Einzelbeobachtungen vom Mittel sehr gering sind, obgleich zwei verschiedene Volumina verwendet wurden, da ein Apparat inzwischen gesprungen war.

Am 17. und 18. 11. 81 war

$$V_1 = 1221,5^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1194,6^{\text{ccm}} \quad q = 3,856^{\square \text{cm}}$$

am 10. 1. 82 aber

$$V_1 = 1180,95^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1162,8^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763^{\square \text{cm}}$$

Frühere Beobachtungen zum Vergleich liegen nicht vor.

Tabelle XI.

| Datum.      | T       | T <sub>2</sub> | ϑ    | h      | z     |
|-------------|---------|----------------|------|--------|-------|
| 17. 11. 81. | 0,62905 | 0,55278        | 17,2 | 77,707 | 1,189 |
|             |         | 0,56057        |      | 68,107 | 1,192 |
|             |         | 0,57068        |      | 56,307 | 1,196 |
|             |         | 0,58042        |      | 45,407 | 1,204 |
|             |         | 0,59072        |      | 34,807 | 1,206 |
|             |         | 0,60148        |      | 24,607 | 1,193 |
| 18. 11. 81. | 0,62797 | 0,56089        | 16,1 | 65,51  | 1,211 |
|             |         | 0,57079        |      | 55,11  | 1,196 |
|             |         | 0,60841        |      | 17,01  | 1,202 |
| 10. 1. 82.  | 0,74847 | 0,65503        | 17,3 | 74,92  | 1,202 |
|             |         | 0,66271        |      | 67,65  | 1,200 |
|             |         | 0,66600        |      | 64,52  | 1,201 |
|             |         | 0,67091        |      | 60,52  | 1,191 |
|             |         | 0,67580        |      | 55,67  | 1,199 |
|             |         | 0,68147        |      | 50,42  | 1,205 |
|             |         | 0,68764        |      | 45,52  | 1,196 |
|             |         | 0,69492        |      | 39,42  | 1,197 |
|             |         | 0,65711        |      | 75,82  | 1,204 |

Mittelwerth 1,1991

Tabelle XII.

$$V_1 = 1175,60 \text{ ccm} \quad V_2 = 1156,5 \text{ ccm} \quad q = 3,9763 \square \text{ cm}$$

| Datum     | T       | T <sub>2</sub> | ϑ    | h     | z     |
|-----------|---------|----------------|------|-------|-------|
| 2. 2. 82. | 0,74781 | 0,72554        | 22,5 | 16,55 | 1,105 |
|           |         | 0,72915        |      | 13,81 | 1,100 |
|           |         | 0,73255        |      | 11,23 | 1,099 |
|           |         | 0,72571        | 22,6 | 16,36 | 1,108 |
|           |         | 0,73160        |      | 11,82 | 1,112 |
|           |         | 0,73562        |      | 8,80  | 1,114 |
| 4. 3. 82. | 0,74995 | 0,72184        | 37,2 | 20,82 | 1,118 |
|           |         | 0,72832        |      | 15,90 | 1,111 |
|           |         | 0,73401        |      | 11,57 | 1,113 |
|           |         | 0,72342        | 38,1 | 19,87 | 1,102 |
|           |         | 0,72956        |      | 14,94 | 1,113 |
|           |         | 0,73304        |      | 12,25 | 1,119 |
|           |         | 0,72306        | 38,5 | 20,06 | 1,108 |
|           |         | 0,72740        |      | 16,23 | 1,112 |
|           |         | 0,73112        |      | 13,71 | 1,116 |

Mittelwerth 1,110

### Chloroform $\text{CHCl}_3$ .

Es wurde diese Chlorverbindung aus einer hiesigen Handlung bezogen, dann mit kohlen-saurem Kali, später mit Phosphorsäureanhydrid versetzt und fractionirt. Die verwendete Flüssigkeit hatte ihren Siedepunkt bei  $61\text{--}62^\circ \text{C}$ .

Wegen der Höhe dieses Punktes konnte ich den Dampf nur bei geringem Druck und hoher Temperatur beobachten, da er sich sehr leicht condensirte. (Werthe cfr. Tab. XII.)

Nach den Beobachtungen von Regnault ist  $\kappa = 1,119$ , differirt also mit dem vorstehenden um  $c. 1\%$ . Hier scheint sich eine Abhängigkeit vom Druck zu zeigen, denn bei mehreren Angaben wächst der Werth von  $\kappa$  mit abnehmendem Druck.

### Methylen bichloratum $\text{CH}_2 \text{Cl}_2$ .

Das Methylenchlorid war von Trommsdorf bezogen, wurde mit kohlen-saurem Kali versetzt und mit Phosphorsäureanhy-

Tabelle XIII.

$$V_1 = 1175,60^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1156,5^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763 \square^{\text{cm}}$$

| Datum     | T       | $T_2$   | $\vartheta$ | h     | $\kappa$ |
|-----------|---------|---------|-------------|-------|----------|
| 3. 2. 82. | 0,74735 | 0,70346 | 24,3        | 33,61 | 1,123    |
|           |         | 0,70536 |             | 32,41 | 1,109    |
|           |         | 0,70726 |             | 30,50 | 1,121    |
|           |         | 0,71063 | 24,4        | 28,00 | 1,110    |
|           |         | 0,71201 |             | 26,70 | 1,117    |
|           |         | 0,71489 | 24,3        | 24,48 | 1,112    |
|           |         | 0,71594 |             | 23,63 | 1,113    |
|           |         | 0,71767 | 24,2        | 21,98 | 1,126    |
| 4. 2. 82. | 0,74777 | 0,68487 | 39,1        | 50,82 | 1,109    |
|           |         | 0,68790 |             | 47,71 | 1,116    |
|           |         | 0,69121 |             | 44,56 | 1,121    |
|           |         | 0,69478 | 40,8        | 41,67 | 1,115    |
|           |         | 0,69714 |             | 39,28 | 1,124    |
|           |         | 0,70078 |             | 35,45 | 1,147    |
|           |         | 0,70507 | 41,6        | 31,83 | 1,150    |
|           |         | 0,71065 |             | 28,09 | 1,119    |
|           |         | 0,72128 |             | 19,94 | 1,101    |
|           |         | 0,72422 | 42,0        | 17,40 | 1,114    |

Mittelwerth 1,1192

drid geschüttelt. Bei der Destillation zeigte es einen Siedepunkt von  $45^{\circ}$  C.

Eine Abhängigkeit von Druck oder Temperatur ist ersichtlich.

### Aethylen $C_2 H_4$ .

Dieses Gas wurde entwickelt aus Alkohol und Schwefelsäure, geleitet durch einen Rückflusskühler, Wasser und Kalilauge in einen Gasometer; von dort gelangte es durch Schwefelsäure, Kalilauge und Chlorcalcium in den Apparat.

Tabelle XIV.

$$V_1 = 1180,95^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1162,8^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763 \square^{\text{cm}}$$

| Datum      | T       | T <sub>2</sub> | $\vartheta$ | h      | z     |
|------------|---------|----------------|-------------|--------|-------|
| 5. 12. 81. | 0,74843 | 0,65064        | 15,3        | 76,829 | 1,240 |
|            |         | 0,66254        | 15,4        | 65,629 | 1,241 |
|            |         | 0,67292        | 15,3        | 56,429 | 1,238 |
|            |         | 0,68327        |             | 47,229 | 1,247 |
|            |         | 0,69801        | 15,4        | 35,729 | 1,239 |
|            |         | 0,71362        |             | 23,629 | 1,247 |
|            |         | 0,72572        |             | 15,029 | 1,246 |
| 4. 12. 81. | 0,74720 | 0,64855        | 16,7        | 77,338 | 1,248 |
|            |         | 0,66044        |             | 66,588 | 1,245 |
|            |         | 0,66705        |             | 60,338 | 1,244 |
|            |         | 0,68046        |             | 48,838 | 1,242 |
|            |         | 0,69357        |             | 37,838 | 1,251 |
|            |         | 0,70606        |             | 28,138 | 1,256 |
|            |         | 0,71717        |             | 20,338 | 1,240 |
| 6. 12. 81. | 0,74831 | 0,64981        | 29,5        | 77,393 | 1,243 |
|            |         | 0,66252        |             | 65,793 | 1,235 |
|            |         | 0,67145        |             | 57,393 | 1,243 |
|            |         | 0,68932        |             | 42,393 | 1,241 |
|            |         | 0,70455        |             | 30,293 | 1,246 |
|            |         | 0,71146        |             | 25,393 | 1,234 |
|            |         | 0,72574        |             | 14,993 | 1,243 |

Mittelwerth 1,243

Der Vergleich mit frühern Beobachtungen ergibt eine Uebereinstimmung bis auf 1% mit Masson 1,257 und Cazin

1,257, dagegen weicht der Werth von Regnault 1,125, um ca. 12 % ab.

Ein Einfluss der Temperatur oder des Druckes zeigt sich nicht.

### Aldehyd $C_2H_4O$ .

In Acetaldehyd der Fabrik von Trommsdorf wurde trockener Ammoniak geleitet, woraus Acetaldehydammoniak krystallisirte. Dieses Salz wurde durch Schwefelsäure zersetzt und die Flüssigkeit dann destillirt, wobei ein Siedepunkt von  $21^0$  C. sich zeigte.

Tabelle XV.

$$V_1 = 1175,60 \text{ ccm} \quad V_2 = 1156,5 \text{ ccm} \quad q = 3,9763 \square \text{ cm}$$

| Datum     | T       | T <sub>2</sub> | θ    | h      | κ     |
|-----------|---------|----------------|------|--------|-------|
| 2. 2. 82. | 0,74776 | 0,67654        | 22,7 | 57,46  | 1,131 |
|           |         | 0,68264        |      | 51,88  | 1,130 |
|           |         | 0,68659        |      | 48,16  | 1,133 |
|           |         | 0,69331.       |      | 42,37  | 1,130 |
|           |         | 0,69777        |      | 38,18  | 1,140 |
|           |         | 0,70237        |      | 34,19  | 1,144 |
|           |         | 0,70679        |      | 30,20  | 1,158 |
|           |         | 0,71128        |      | 26,59  | 1,160 |
|           |         | 0,71660        |      | 22,40  | 1,163 |
|           |         | 0,72335        |      | 17,26  | 1,166 |
| Mittel    |         |                |      | 1,1455 |       |

Für diesen Dampf liegen frühere Beobachtungen nicht vor, und deshalb ist es um so mehr zu bedauern, dass durch ein Versehen ein Theil meiner Flüssigkeit unbrauchbar wurde, so dass ich nur jene 10 Versuche anstellen konnte. Aus ihnen folgt eine deutliche Abhängigkeit der Grösse  $\kappa$  vom Druck, und es erscheint mir aus dieser Ursache die Angabe des Mittels  $\kappa = 1,1455$  etwas unrichtig.

### Methylchloroform $\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl}_3$ .

Diese Substanz wurde mit kohlensaurem Kali versetzt und fractionirt, in Verwendung kam der Theil, welcher den Siedepunkt bei  $71-72^\circ \text{C}$ . besass.

Tabelle XVI.

$$V_1 = 1175,60^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1156,5^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763^{\text{cm}}$$

| Datum     | T       | T <sub>2</sub> | ϑ    | h     | α      |
|-----------|---------|----------------|------|-------|--------|
| 4. 2. 82. | 0,74774 | 0,72254        | 44,3 | 19,96 | 1,043  |
|           |         | 0,72518        |      | 17,83 | 1,040  |
|           |         | 0,73007        |      | 13,84 | 1,038  |
|           |         | 0,73470        | 44,1 | 10,11 | 1,038  |
|           |         | 0,73802        |      | 7,54  | 1,031  |
|           |         | 0,72631        | 43,5 | 17,06 | 1,029  |
|           |         | 0,72758        |      | 15,88 | 1,037  |
|           |         | 0,73162        |      | 12,58 | 1,039  |
|           |         | 0,73470        | 43,7 | 10,12 | 1,037  |
|           |         | 0,73738        |      | 8,00  | 1,039  |
| Mittel    |         |                |      |       | 1,0371 |

Eine grössere Variation des Druckes oder der Temperatur gestattete die Höhe des Siedepunktes nicht, und die Abweichungen der angeführten Ziffern sind wohl als Beobachtungsfehler anzusehen.

Frühere Angaben liegen nicht vor.

### Aethylchlorid $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ .

Die kalte Lösung von Zinkchlorid in Alkohol wurde durch Chlorwasserstoff gesättigt und dann erwärmt. Das gebildete Aethylchlorid gelangte durch Wasser und Chlorcalcium in ein Gefäss, welches in einer Kältemischung stand und nach

der Füllung zugeschmolzen wurde. Dieses Gefäß ward dann zum Versuch direct am Apparat befestigt.

Tabelle XVII.

$$V_1 = 1180,95^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1162,8^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763^{\square\text{cm}}$$

| Datum       | T       | T <sub>2</sub> | ϑ    | h      | κ      |
|-------------|---------|----------------|------|--------|--------|
| 20. 12. 81. | 0,74856 | 0,65712        | 21,2 | 78,402 | 1,117  |
|             |         | 0,66921        |      | 66,102 | 1,117  |
|             |         | 0,67680        |      | 59,202 | 1,109  |
|             |         | 0,68226        |      | 53,402 | 1,122  |
|             |         | 0,68810        |      | 48,502 | 1,111  |
|             |         | 0,69234        |      | 44,502 | 1,116  |
|             |         | 0,69925        |      | 37,902 | 1,131  |
|             |         | 0,70465        |      | 32,902 | 1,147  |
|             |         | 0,71226        |      | 26,602 | 1,153  |
| 22. 12. 81. | 0,74961 | 0,65895        | 29,5 | 78,006 | 1,111  |
|             |         | 0,67019        |      | 65,656 | 1,127  |
|             |         | 0,67688        |      | 59,056 | 1,130  |
|             |         | 0,68285        |      | 54,006 | 1,119  |
|             |         | 0,68700        |      | 49,906 | 1,125  |
|             |         | 0,69244        |      | 45,406 | 1,115  |
|             |         | 0,69876        |      | 39,506 | 1,125  |
|             |         | 0,70363        |      | 34,806 | 1,142  |
|             |         | 0,71099        |      | 28,706 | 1,146  |
| Mittel      |         |                |      |        | 1,1257 |

Der Werth 1,1257 differirt mit demjenigen von Regnault 1,126 um ca. 0,03 %, bestätigt also dessen Resultat.

Eine Variation mit abnehmendem Druck scheint sich zu zeigen.

### Aethylenbichlorat $\text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$ .

Diese Kohlenstoffverbindung wurde mit kohlensaurem Kali versetzt und fractionirt, der verwendete Theil besass den Siedepunkt bei 84—85° C.

Tabelle XVIII.

$$V_1 = 1175,60 \text{ ccm} \quad V_2 = 1156,5 \text{ ccm} \quad q = 3,9763 \square \text{ cm}$$

| Datum     | T       | T <sub>2</sub> | θ    | h      | z     |
|-----------|---------|----------------|------|--------|-------|
| 4. 8. 82. | 0,74670 | 0,73449        | 42,2 | 9,03   | 1,090 |
|           |         | 0,73804        |      | 6,46   | 1,072 |
|           |         | 0,73135        |      | 11,50  | 1,082 |
|           |         | 0,73450        | 42,3 | 9,03   | 1,089 |
|           |         | 0,73862        |      | 5,90   | 1,094 |
|           |         | 0,74088        | 42,2 | 4,25   | 1,092 |
|           |         | 0,73245        |      | 10,59  | 1,088 |
|           |         | 0,73646        | 42,1 | 7,60   | 1,083 |
|           |         | 0,74031        |      | 4,72   | 1,079 |
| Mittel    |         |                |      | 1,0854 |       |

Regnault hat für diesen Dampf den Werth 1,097 gefunden, also 1 % grösser als das obige Mittel, und vermute ich, dass dieses in den Beobachtungsfehlern begründet ist, die bei meiner Versuchsanordnung mit Abnahme des Druckes wachsen, weil  $\frac{T^2}{T_2^2}$  dann sehr klein wird, und der Einfluss der letzten Ziffern von T und T<sub>2</sub> wächst.

### Methyläther C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O.

Beim Erhitzen von Schwefelsäure und Methylalkohol auf 140° C. entwickelte sich das Gas und gelangte durch einen Rückflusskühler in concentrirte Schwefelsäure, welche es absorbirt. Bei dem Zutropfeln von Wasser wurde es frei, und erreichte durch Kalilauge und Chlorcalcium den Apparat.

Tabelle XIX.

$$V_1 = 1180,95^{\text{ccm}} \quad V_2 = 1162,8^{\text{ccm}} \quad q = 3,9763 \quad \square^{\text{cm}}$$

| Datum       | T       | T <sub>2</sub> | θ     | h      | κ      |
|-------------|---------|----------------|-------|--------|--------|
| 17. 12. 81. | 0,74785 | 0,66041        | 5,8   | 75,197 | 1,1063 |
|             |         | 0,66603        |       | 69,397 | 1,1073 |
|             |         | 0,67088        | 5,7   | 64,597 | 1,1062 |
|             |         | 0,68069        | 5,8   | 54,997 | 1,1093 |
|             |         | 0,68492        |       | 51,097 | 1,1082 |
|             |         | 0,69101        | 5,9   | 45,497 | 1,1095 |
|             |         | 0,71672        | 5,8   | 23,597 | 1,1080 |
|             |         | 0,71986        |       | 21,197 | 1,1035 |
|             |         |                |       | Mittel | 1,1072 |
| 16. 12. 81. | 0,74885 | 0,65991        | 30,1  | 75,985 | 1,1138 |
|             |         | 0,66483        |       | 70,835 | 1,1152 |
|             |         | 0,67035        | 30,2  | 65,585 | 1,1110 |
|             |         | 0,67561        |       | 60,485 | 1,1106 |
|             |         | 0,68079        | 30,25 | 55,185 | 1,1177 |
|             |         | 0,69123        |       | 45,985 | 1,1090 |
|             |         | 0,71749        | 30,2  | 23,585 | 1,1091 |
|             |         | 0,70391        |       | 34,685 | 1,1142 |
|             |         | 0,71103        | 30,3  | 28,815 | 1,1109 |
|             |         | 0,72441        |       | 17,955 | 1,1172 |
|             |         |                |       | Mittel | 1,1127 |

Bei diesem Gase zeigt sich die Eigenthümlichkeit, dass die Grösse  $\kappa$  mit zunehmender Temperatur grösser wird, dagegen vom Druck unabhängig ist.

Frühere Beobachtungen zum Vergleichen liegen nicht vor.

### Methylal $C_3H_5O_2$ .

Diese Kohlenwasserstoffverbindung war von Trommsdorf bezogen, wurde mit kohlensaurem Kali, Phosphorpentoxyd versetzt und fractionirt. Der verwendete Theil besass den Siedepunkt bei 41—42° C.

Tabelle XX.

$$V_1 = 1175,60 \text{ ccm} \quad V_2 = 1156,5 \text{ ccm} \quad q = 3,9763 \text{ □cm}$$

| Datum     | T       | T <sub>2</sub> | ϑ    | h       | κ     |       |
|-----------|---------|----------------|------|---------|-------|-------|
| 6. 3. 82. | 0,75012 | 0,72703        | 12,7 | 17,75   | 1,067 |       |
|           |         | 0,73050        |      | 14,78   | 1,072 |       |
|           |         | 0,72551        |      | 19,09   | 1,063 |       |
|           |         | 0,73094        |      | 14,63   | 1,068 |       |
|           |         |                |      | Mittel  | 1,065 |       |
| 6. 3. 82. | 0,75163 | 0,71667        | 22,5 | 27,11   | 1,081 |       |
|           |         | 0,72298        |      | 22,08   | 1,074 |       |
|           |         | 0,72833        |      | 17,85   | 1,069 |       |
|           |         | 0,72850        |      | 17,53   | 1,079 |       |
|           |         |                |      | 0,73152 | 15,28 | 1,071 |
|           |         |                |      | Mittel  | 1,075 |       |
| 4. 3. 82. | 0,75031 | 0,70953        | 37,3 | 32,05   | 1,082 |       |
|           |         | 0,71301        |      | 29,02   | 1,084 |       |
|           |         | 0,71759        |      | 25,17   | 1,086 |       |
|           |         | 0,72380        |      | 19,88   | 1,099 |       |
|           |         | 0,70707        | 36,8 | 34,16   | 1,081 |       |
|           |         | 0,71286        |      | 29,08   | 1,080 |       |
|           |         | 0,72680        |      | 17,41   | 1,104 |       |
|           |         | 0,69810        |      | 42,04   | 1,082 |       |
|           |         | 0,70271        | 37,2 | 37,69   | 1,089 |       |
|           |         | 0,70790        |      | 32,36   | 1,118 |       |
|           |         | 0,71408        |      | 28,17   | 1,082 |       |
|           |         | 0,72024        |      | 22,83   | 1,094 |       |
| 8. 3. 82. | 0,75026 | 0,67645        | 42,1 | 62,44   | 1,081 |       |
|           |         | 0,68738        |      | 51,62   | 1,087 |       |
|           |         | 0,69441        |      | 45,45   | 1,080 |       |
|           |         | 0,70018        |      | 39,51   | 1,099 |       |
|           |         | 0,70663        |      | 33,91   | 1,101 |       |
|           |         | 0,71369        |      | 28,39   | 1,085 |       |
|           |         | 0,71964        |      | 23,59   | 1,080 |       |
|           |         |                |      | Mittel  | 1,094 |       |

Das Methylal zeigt in der Tabelle 3 verschiedene Mittelwerthe und zwar wächst wieder  $\kappa$  mit steigender Temperatur, vom Druck dagegen erscheint die Grösse  $\kappa$  unabhängig.

Frühere Beobachtungen sind nicht vorhanden.

### Aethyläther $C_4H_{10}O$ .

Gewöhnlicher Schwefeläther wurde mit destillirtem Wasser geschüttelt, durch kohlensaures Kali entwässert, destillirt, mit metallischem Natrium versetzt und zeigte beim Fractioniren  $35^{\circ} C.$ ; durch eine Chlorcalciumröhre gelangte er in den Apparat.

Tabelle XXI.

$$V_1 = 1180,95 \text{ cem} \quad V_2 = 1162,8 \text{ cem} \quad q = 3,9763 \text{ } \square \text{cm}$$

| Datum      | T       | $T_2$   | $\vartheta$ | h     | $\alpha$ |
|------------|---------|---------|-------------|-------|----------|
| 21. 1. 82. | 0,74892 | 0,71420 | 22,5        | 28,64 | 1,024    |
|            |         | 0,71868 |             | 24,76 | 1,023    |
|            |         | 0,72195 |             | 22,04 | 1,017    |
|            |         | 0,72666 |             | 17,64 | 1,039    |
|            |         | 0,73139 | 23,0        | 13,74 | 1,041    |
| 30. 1. 82. | 0,75019 | 0,66936 | 45,4        | 73,97 | 1,020    |
|            |         | 0,67340 |             | 69,84 | 1,017    |
|            |         | 0,67968 | 45,3        | 62,60 | 1,027    |
|            |         | 0,68075 |             | 61,72 | 1,024    |
|            |         | 0,68753 | 45,4        | 54,60 | 1,029    |
|            |         | 0,69459 |             | 47,35 | 1,036    |
|            |         | 0,70130 | 45,4        | 41,55 | 1,023    |
|            |         | 0,70721 |             | 35,55 | 1,038    |
|            |         | 0,71232 | 45,5        | 31,37 | 1,026    |
|            |         | 0,71881 |             | 25,38 | 1,036    |
|            |         | 0,72993 | 45,4        | 15,96 | 1,040    |
| Mittel     |         |         |             |       | 1,0287   |

Bei diesem Dampf zeigt sich die Abhängigkeit der Grösse  $\alpha$  von der Temperatur nicht so deutlich wie beim Methylal, sie scheint aber dennoch vorhanden zu sein und würde wohl bei einer grösseren Temperaturdifferenz mehr hervortreten.

Nach dieser Angabe der Resultate für die einzelnen Gase und Dämpfe will ich in einer neuen Tabelle alle gefundenen Mittelwerthe zusammenstellen und einige allgemeine Bemerkungen hinzufügen.

In der ersten Columnne stehen die Namen der betreffenden Stoffe, in der zweiten ihre chemischen Zeichen, in der dritten die Atomzahlen, nach welchen die Gase in dieser

Tabelle XXII.

| Name                      | chem. Zeichen | Atom-<br>zahl | Druckhöhe |         | Temperatur |         | z      |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|---------|------------|---------|--------|
|                           |               |               | Maximum   | Minimum | Maximum    | Minimum |        |
| Luft .....                |               |               | 76,980    | 33,400  | 22,0       | 12,0    | 1,4062 |
| Sauerstoff .....          | $O_2$         | 2             | 73,730    | 31,590  | 20,6       | 16,4    | 1,4025 |
| Chlorwasserstoff .....    | H Cl          | 2             | 78,490    | 25,660  | 41,1       | 18,8    | 1,3980 |
| Bromwasserstoff .....     | H Br          | 2             | 75,240    | 29,390  | 37,8       | 10,1    | 1,3647 |
| Kohlensäure .....         | $CO_2$        | 3             | 75,890    | 27,820  | 33,7       | 9,4     | 1,2653 |
| Schweflige Säure .....    | $SO_2$        | 3             | 79,814    | 24,614  | 33,7       | 15,5    | 1,2562 |
| Schwefelwasserstoff ..... | $H_2S$        | 3             | 76,740    | 25,900  | 40,0       | 10,2    | 1,2759 |
| Schwefelkohlenstoff ..... | $CS_2$        | 3             | 70,490    | 16,990  | 39,8       | 21,3    | 1,1890 |
| Ammoniak .....            | $NH_3$        | 4             | 75,647    | 33,320  | 30,1       | 10,7    | 1,2622 |
| Methan .....              | $CH_4$        | 5             | 76,629    | 16,391  | 30,0       | 18,5    | 1,3160 |
| Methylchlorid .....       | $CH_3Cl$      | 5             | 77,707    | 17,010  | 17,3       | 16,1    | 1,1991 |
| Methylenchlorid .....     | $CH_2Cl_2$    | 5             | 50,820    | 17,400  | 42,0       | 24,2    | 1,1192 |
| Chloroform .....          | $CHCl_3$      | 5             | 20,820    | 8,800   | 38,5       | 22,5    | 1,1100 |
| Aethylen .....            | $C_2H_4$      | 6             | 77,393    | 14,993  | 29,5       | 15,3    | 1,2430 |
| Acetaldehyd .....         | $C_2H_4O$     | 7             | 57,460    | 17,260  | 22,7       | 22,7    | 1,1455 |
| Aethylchlorid .....       | $C_2H_5Cl$    | 8             | 78,402    | 26,602  | 29,5       | 21,2    | 1,1257 |
| Aethylchlorid .....       | $C_2H_5Cl_2$  | 8             | 11,500    | 4,720   | 42,3       | 42,1    | 1,0854 |
| Methylchloroform .....    | $C_2H_3Cl_3$  | 8             | 19,960    | 8,000   | 44,3       | 43,5    | 1,0371 |
| Methyläther .....         | $C_2H_6O$     | 9             | 75,197    | 21,197  |            | 5,7     | 1,1072 |
|                           |               |               | 75,985    | 17,955  | 30,3       |         | 1,1127 |
| Methylal .....            | $C_3H_8O_2$   | 13            | 17,750    | 14,630  |            | 12,7    | 1,0650 |
|                           |               |               | 27,110    | 15,280  |            | 22,5    | 1,0750 |
|                           |               |               | 62,440    | 17,410  | 42,1       | 36,8    | 1,0940 |
| Aethyläther .....         | $C_4H_{10}O$  | 15            | 73,970    | 13,740  | 45,4       | 22,5    | 1,0288 |

Tabelle geordnet sind. Die vierte und fünfte Columne enthält die Druckhöhen, die sechste und siebente die Temperatur und die achte den gefundenen Werth von  $\alpha$ .

Bei Druck und Temperatur gebe ich das Maximum und Minimum an, für welches die betreffende Zahl  $\alpha$  gilt; wo  $\alpha$  variirt, sind besondere Horizontalreihen verwendet.

Unter den Resultaten von  $\alpha$  herrscht die Gesetzmässigkeit, dass sie mit steigender Atomzahl abnehmen, Ausnahmen ergeben sich jedoch mehrere.

Die Grenzwerte, welche Pilling<sup>1)</sup> für das Verhältniss  $\alpha$  in seiner Abhängigkeit von der Atomzahl berechnet, gelten nach den vorstehenden Beobachtungen nicht für alle Gase mit 2 Atomen, denn die Verbindungen des Chlor und Brom zeigen zu kleine Angaben, was von Strecker<sup>2)</sup> ebenfalls für Chlor, Brom, Jod selbst beobachtet ist. Dieser Einfluss des Chlors zeigt sich recht deutlich bei Methylchlorid, Metylenchlorid und Chloroform, bei welchen trotz gleicher Atomzahl der Ersatz je eines Atoms H durch Cl ein sichtbares Sinken des Werthes von  $\alpha$  bewirkt. Ebenso erfolgt bei Aethylchlorid, Aethylenchlorid und Methylchloroform, welche je 8 Atome besitzen, durch denselben Ersatz ein Fallen der Grösse  $\alpha$  von 1,1257 auf 1,0854 und 1,0370, d. h.  $\alpha$  nimmt stets um 4 Einheiten in der dritten Decimale ab.

Ob Jodverbindungen dasselbe Verhalten zeigen, konnte ich nicht untersuchen, weil Quecksilber den Jodwasserstoff zersetzt.

Eine ähnliche Wirkung wie Chlor, Brom, Jod übt auch die Ersetzung des Wasserstoffs durch Schwefel aus, da sich für Schwefelkohlenstoff kleinere als die von der Theorie geforderten Werthe ergeben haben.

Von den andern Gasen besitzen Methan und Aethylen zu grosse Werthe, also gelten für sie nicht die Annahmen von Pilling, obgleich sie zu den permanenten Gasen gehören, und es erscheint zweifelhaft, ob jene Hypothese gestattet ist.

<sup>1)</sup> Pilling: Ueber die Beziehung der Wärmecapacität. Jena 1876.

<sup>2)</sup> Strecker: Wied. Ann. XIII. 20.

Für alle Dämpfe liegt  $\alpha$  unterhalb jener Grenzwerte und zeigt meistens eine Aenderung mit Druck und Temperatur und zwar ein Wachsen.

Mit zunehmender Temperatur geschieht dieses z. B. bei Methylal und Methyläther, mit abnehmendem Druck bei Chloroform und Aldehyd. Dieses mag vielleicht darin begründet sein, dass ein Sinken des Drucks und ein Steigen der Temperatur eine Dissociation der Molekeln bewirken und dadurch die Dämpfe dem idealen Gaszustande näher führen. Nun will ich noch die Werthe für die verschiedenen Arten der Energie berechnen, die sich in Gasen und Dämpfen zeigen.

Im Anschluss an die von O. E. Meyer gewählten Bezeichnungen sind folgende Gleichungen zu verwenden.

$$\frac{K}{H} = \frac{3}{2} (\alpha - 1)$$

$$\frac{\mathcal{E}}{E} = \frac{H}{K} - 1$$

$$\frac{e}{\bar{E}} = \frac{1}{n} \mathcal{E}$$

wo K die kinetische Energie der Molekeln in der Volumeneinheit, H die gesammte kalorische Energie, E die Energie der Schwerpunktsbewegung einer Molekel,  $\mathcal{E}$  die mittlere Energie aller  $n$ -Atome einer Molekel und  $e$  der Mittelwerth der Energie eines einzigen Atoms bedeuten.

Die folgende Tabelle enthält ausser diesen drei Verhältnissen, welche nach den von mir gefundenen Werthen von  $\alpha$  berechnet sind, noch die Angaben von  $\frac{e}{\bar{E}}$ , welche O. E. Meyer<sup>1)</sup> aus Beobachtungen von Regnault theoretisch bestimmt hat, und in der letzten Columnne die Differenz dieser beiden Verhältnisse.

<sup>1)</sup> O. E. Meyer: Theorie der Gase. pag. 94.

Tabelle XXIII.


| Name                  | chemische<br>Zeichen                          | Atom-<br>zahl | $\nu$  | $\frac{K}{H}$ | $\frac{G}{E}$ | beob.<br>$\frac{G}{E}$ | berechn.<br>$\frac{G}{E}$ | Differenz |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------|
| Luft .....            |                                               |               | 1,4062 | 0,6093        | 0,641         |                        |                           |           |
| Sauerstoff .....      | O <sub>2</sub>                                | 2             | 1,4025 | 0,6037        | 0,656         | 0,328                  | 0,33                      | — 0,002   |
| Chlorwasserstoff ...  | HCl                                           | 2             | 1,3980 | 0,5970        | 0,675         | 0,337                  | 0,29                      | + 0,047   |
| Bromwasserstoff ...   | HBr.                                          | 2             | 1,3647 | 0,5470        | 0,828         | 0,414                  |                           |           |
| Kohlensäure .....     | CO <sub>2</sub>                               | 3             | 1,2653 | 0,3979        | 1,513         | 0,504                  | 0,51                      | — 0,006   |
| Schweflige Säure...   | SO <sub>2</sub>                               | 3             | 1,2563 | 0,3844        | 1,601         | 0,534                  | 0,54                      | — 0,006   |
| Schwefelkohlenstoff . | CS <sub>2</sub>                               | 3             | 1,1890 | 0,2835        | 2,527         | 0,842                  | 0,77                      | + 0,072   |
| Schwefelwasserstoff . | H <sub>2</sub> S                              | 3             | 1,2759 | 0,4138        | 1,416         | 0,472                  | 0,37                      | + 0,102   |
| Ammoniak .....        | NH <sub>3</sub>                               | 4             | 1,2622 | 0,3933        | 1,542         | 0,385                  | 0,31                      | + 0,075   |
| Methan .....          | CH <sub>4</sub>                               | 5             | 1,3160 | 0,4740        | 1,110         | 0,222                  | 0,30                      | — 0,078   |
| Methylchlorid .....   | CH <sub>3</sub> Cl                            | 5             | 1,1991 | 0,2986        | 2,348         | 0,469                  |                           |           |
| Methylchlorid ...     | CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>               | 5             | 1,1192 | 0,1788        | 4,593         | 0,919                  |                           |           |
| Chloroform .....      | CHCl <sub>3</sub>                             | 5             | 1,1100 | 0,1650        | 5,060         | 1,012                  | 0,92                      | + 0,092   |
| Aethylen .....        | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>                 | 6             | 1,2430 | 0,3645        | 1,744         | 0,291                  | 0,39                      | — 0,099   |
| Aldehyd .....         | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O               | 7             | 1,1455 | 0,2182        | 3,582         | 0,512                  |                           |           |
| Aethylchlorid .....   | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl              | 8             | 1,1257 | 0,1886        | 4,304         | 0,538                  | 0,53                      | — 0,008   |
| Aethylenchlorid....   | C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> | 8             | 1,0854 | 0,1281        | 6,808         | 0,551                  | 0,74                      | + 0,111   |
| Methylchloroform ..   | C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> | 8             | 1,0371 | 0,0557        | 16,953        | 2,119                  |                           |           |
| Methyläther .....     | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O               | 9             | 1,1072 | 0,1608        | 5,219         | 0,579                  |                           |           |
|                       |                                               | 9             | 1,1127 | 0,1690        | 4,915         | 0,546                  |                           |           |
|                       |                                               | 13            | 1,0650 | 0,0975        | 9,257         | 0,712                  |                           |           |
| Methylal .....        | C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub>  | 13            | 1,0750 | 0,1125        | 7,889         | 0,607                  |                           |           |
|                       |                                               | 13            | 1,0940 | 0,1410        | 6,092         | 0,469                  |                           |           |
| Aethyläther .....     | C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O              | 15            | 1,0257 | 0,0431        | 22,202        | 1,480                  | 0,68                      | + 0,800   |

Die Werthe von  $\frac{c}{E}$  sind fast alle kleiner als 1, wie es die Theorie verlangt, nur Chloroform, Methylchloroform und Aethyläther weichen ab. Hiervon mag wohl theils das Chlor die Ursache sein, welches sich auch sonst schon abweichend gezeigt hat, theils der Umstand, dass diese 3 Stoffe nicht Gase, sondern Dämpfe sind und also für dieselben die Voraussetzungen der Theorie nicht mehr gelten. Dieselben 2 Gründe dürften auch wohl für die Stoffe anzunehmen sein, welche wie Schwefelkohlenstoff, Methylenchlorid und Aethylenchlorid einen Werth nahe an 1 zeigen, zumal beim Aethyläther ein Wachsen von  $\alpha$  mit abnehmendem Druck auftritt. Es nähert sich also dieser Dampf dem Gaszustande, was auch aus dem Werthe  $\alpha = 1,040$  und  $\frac{c}{E} = 1,111$  hervorgeht, welcher dem von der Theorie geforderten und also nur für den Gaszustand giltigen  $\frac{c}{E} = 0,68$  nahe kommt.

Die Beobachtungen bestätigen also das von O. E. Meyer nach der Theorie aufgestellte Gesetz:

In Gasen mit mehratomigen Molekeln ist die mittlere Energie eines Atoms immer kleiner als die Energie des Schwerpunktes der Molekel.

Zum Schluss muss ich meinem hochverehrten Lehrer Herrn Professor O. E. Meyer meinen grössten Dank für die gütige Unterstützung und freundliche Förderung meiner Arbeit sowie meiner Studien aussprechen, und auch Herrn Dr. O. Schumann fühle ich mich für seine Hilfe und Rathschläge zu grossem Dank verpflichtet.





# Vita.



Ich, Paul Alfred Müller, bin geboren den 27. Juli 1856 in Danzig als Sohn des Stadt- und Kreis-Gerichts-Secretairs Carl Müller, und besuchte das städtische Gymnasium meiner Vaterstadt, welches ich Ostern 1878 mit dem Zeugniß der Reife verliess. Während der folgenden neun Semester hörte ich auf der Universität Breslau die Vorlesungen der Herren Professoren: Auerbach, Cohn, Dilthey, Dorn, Galle, Grube, Krause, v. Lasaulx, O. E. Meyer, Oginski, Partsch, Roemer, Rosanes, Schottky, Schroeter, Weber, nahm an den mathematisch-physikalischen Seminars der Herren O. E. Meyer, Rosanes, Schroeter theil und arbeitete vier Semester im physikalischen Institut.

Allen diesen Herren sage ich hiermit meinen wärmsten Dank für die Förderung meiner Studien und insbesondere Herrn Professor O. E. Meyer für die gütige Unterstützung, welche er meinen Arbeiten im physikalischen Institut zu Theil werden liess.

---

## Thesen.



1. Zwischen den Atomzahlen und dem Verhältniss der specifischen Wärmen bei Gasen besteht keine einfache Beziehung.
2. Die absolute Leere ist ein guter Leiter für die Electricität.
3. Es ist wünschenswerth, das Studium der Physik mit demjenigen der Chemie zu verbinden.





